MODUL PRAKTIKUM ASUHAN PRANIKAH DAN PRAKONSEPSI



Penyusun: - Eka Vicky Yulivantina, S.S.T., M.Keb

- dr. Bima Suryantara, SpOG(K)
- Lia Ayu Kusumawardani, S.S.T.,M.Tr.Keb
- Indah Fitri, S.ST.,M.Kes

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI BIDAN STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA TAHUN AJARAN 2019/2020

HALAMAN PENGESAHAN

Disiapkan oleh : Koordinator Mata Kuliah

Eka Vicky Yulivantina, S.S.T., M.Keb

Disahkan oleh : Pembantu Ketua I Bidang Akademik

Siti Fadhilah, S.Si.T., M.Kes

MODUL PRAKTIKUM ASUHAN PRANIKAH DAN PRAKONSEPSI IDENTITAS MAHASISWA

FOTO 3X4

NAMA MAHASISWA	:
NIM	:
TEMPAT & TANGGAL LAHIR	:
ANGKATAN	:
ALAMAT	:
NO TLP/HP	:
EMAIL	:

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat serta berkah-Nya kami dapat menyelesaikan *Modul Asuhan Pranikah dan Prakonsepsi* untuk program studi kebidanan program pendidikan profesi bidan.

Modul ini berisi tentang gambaran pelaksanaan asuhan pranikah dan prakonsepsi serta tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa berdasarkan kompetensi yang ingin dicapai. Buku ini merupakan pedoman bagi mahasiswa dalam memberikan asuhan kebidanan pranikah dan prakonsepsi kepada klien di lahan praktik sekaligus sebagai pedoman untuk para pembimbing dalam melakukan bimbingan praktik klinik mahasiswa.

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu kami dalam penyusunan modul praktik ini. Kami juga mengharapkan saran dari pembaca untuk penyempurnaaan modul praktik ini.

Yogyakarta, Januari 2021 Penyusun

VISI MISI

PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI BIDAN STIKES GUNA BANGSA YOGYAKARTA

VISI

Menghasilkan lulusan bidan profesional yang unggul, Inovatif dan Berdaya Saing dalam Asuhan Kebidanan Berbasis Kearifan Lokal

MISI

- Menyelenggarakan pendidikan kebidanan yang bermutu untuk mendukung sistem pelayanan kesehatan paripurna yang berfokus pada kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak, keluarga dan masyarakat dengan memanfaatkan kearifan lokal yang sesuai evidence based.
- 2. Menyelenggarakan penelitian guna meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan berbasis kearifan lokal
- 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang berorientasi pada pemberian asuhan kebidanan berbasis kearifan lokal
- 4. Menjalin kerjasama dengan stakeholder dalam negeri dan luar negeri untuk mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN IDENTITAS	4
VISI MISI	5
DAFTAR ISI	6
TATA TERTIB PRAKTIKUM	6
MATERI 1 KONSELING PERSIAPAN KEHAMILAN SEHAT	8
MATERI 2 ANAMNESA PRANIKAH DAN PRAKONSEPSI	25
MATERI 3 PENDIDIKAN KESEHATAN KURVA SUHU BASAL	29
MATERI 4 PEMERIKSAAN MUCUS SERVIKS	33
MATERI 5 KIE PERSIAPAN MENJADI ORANG TUA	36
MATERI 6 MELAKUKAN SKRINNING CA CERVIX DENGAN IVA	40
MATERI 7 MENYIAPKAN SEDIAAN PEMERIKSAAN PAPSMEAR, BV	49

TATA TERTIB PRAKTIKUM

- 1. Praktikum wajib menggunakan seragam STIKes Guna Bangsa Yogyakarta disertai jas laboratorium yang bersih dan rapi.
- 2. Alas kaki harap dilepas dan diletakkan pad arak sepatu dengan rapi.
- 3. Mengisi daftar hadir dan mengambil kunci loker.
- 4. Di dalam laboratorium hanya boleh membawa pensil dan buku panduan praktikum (tas, jaket, HP, dompet dan barang berharga harap ditinggalkan di dalam loker).
- 5. Mahasiswa dilarang merokok, membawa makan dan minuman serta bendabenda tajam dan berbahaya lainnya ke dalam laboratorium.
- 6. Dilarang mengenakan perhiasan (gelang tangan, gelang kaki dan cincin) didalam laboratorium.
- 7. Bagi mahasiswa yang tidak berjilbab wajib mengenakan hairnet dan jepit rambut (untuk yang berponi).
- 8. Turut serta dalam pemeliharaan peralatan laboratorium serta mematuhi Standar Operating Prosedur (SOP) dan Manual Operating Prosedur (MOP) yang berlaku.
- Melaporkan kecelakaan kerja yang terjadi kepada laboran, antara lain tertusuk dan terluka pada saat praktikum yang sebelumnya telah diatasi dengan caracara yang sudah diketahui.
- 10. Melaporkan adanya kerusakan alat dan atau kehilangan alat yang dipinjam, bagi mahasiswa yang merusakkan wajib mengganti sesuai barang yang dirusakkan atau dihilangkan.
- 11. Membuang sampah sesuai jenisnya pada tempat yang telah disediakan.
- 12. Sebelum meninggalkan ruang wajib mengunci loker kembali dan menandatangani daftar hadir.
- 13. Pengguna laboratorium wajib menjaga kebersihan dan kerapihan laboratorium.
- 14. Sebelum meminjam alat, mahasiswa wajib mengisi formulir peminjaman alat.
- 15. Peminjaman alat dilakukan maksimal satu hari sebelum praktikum.
- 16. Peminjaman dan pengembalian alat hanya boleh dilakukan dengan pengawasan petugas laboratorium oleh penanggungjawab kelompok yang sebelumnya sudah dalam kondisi bersih dan rapi.
- 17. Praktikan wajib mematuhi tata tertib yang berlaku, bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi.

Yogyakarta, Juli 2020 Pembantu Ketua I

Siti Fadhilah, S.SiT.,,M.Kes

MATERI 1 KONSELING PERENCANAAN KEHAMILAN SEHAT

A. Konsep Dasar KIE

Konseling merupakan proses pemberian informasi obyektif dan lengkap, dilakukan secara sistematik dengan paduan keterampilan komunikasi interpersonal, teknik bimbingan dan penguasaan pengetahuan klinik bertujuan untuk membantu seseorang mengenali kondisinya saat ini, masalah yang sedang dihadapi dan menentukan jalan keluar/upaya untuk mengatasi masalah tersebut. KIE bertujuan untuk mendorong terjadinya proses perubahan perilaku ke arah yang positif, peningkatan pengetahuan dan sikap agar memiliki perilaku yang sehat dan bertanggung jawab. KIE penting dilakukan untuk persiapan menjadi orang tua karena menjadi orang tua bukanlah hal yang mudah, tetapi tidak juga sesulit yang dibayangkan dan salah satu kunci sukses menjadi orang tua yang baik adalah mempersiapkan diri dari kedua belah pihak.

B. Pengertian Kesehatan Prakonsepsi

Kesehatan prakonsepsi adalah kondisi kesehatan orang tua sebelum terjadi pembuahan. Kesehatan prakonsepsi harus tetap dioptimalkan sekalipun perempuan tidak merencanakan kehamilan mengingat banyak perempuan yang tidak menyadari bahwa dirinya hamil padahal dirinya tidak merencanakan kehamilan. Kesehatan prakonsepsi harus mendapat perhatian dari usia 18 sampai 44 tahun.

C. Standar Pemeriksaan Prakonsepsi Di Indonesia

Pelaksanaan skrining prakonsepsi di Indonesia di atur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 97 Tahun 2014 Tentang pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi, serta pelayanan kesehatan seksual. Pelayanan kesehatan masa sebelum hamil dilakukan untuk mempersiapkan perempuan dalam menjalani kehamilan dan persalinan yang sehat dan selamat serta memperoleh bayi yang sehat. Sasaran pelayanan kesehatan masa sebelum hamil berdasarkan Permenkes No.97 Tahun 2014 adalah remaja, calon pengantin dan pasangan usia subur.

Kegiatan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil berdasarkan Permenkes No.97 Tahun 2014 meliputi :

1. Pemeriksaan fisik

Pemeriksaan fisik yang dimaksudkan paling sedikit meliputi pemeriksaan tanda vital dan pemeriksaan status gizi. Pemeriksaan status gizi harus dilakukan terutama untuk menanggulangi masalah kurang energi kronis (KEK) dan pemeriksaan status anemia.

2. Pemeriksaan penunjang

Pemeriksaan penunjang merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan berdasarkan indikasi medis, terdiri atas pemeriksaan darah rutin, pemeriksaan darah yang dianjurkan, pemeriksaan penyakit menular seksual, pemeriksaan urin rutin dan pemeriksaan penunjang lainnya.

3. Pemberian imunisasi

Pemberian imunisasi dilakukan dalam upaya pencegahan dan perlindungan terhadap penyakit Tetanus. Pemberian imunisasi Tetanus Toxoid (TT) dilakukan untuk mencapai status T5 hasil pemberian imunisasi dasar dan lanjutan. Status T5 ditujukan agar wanita usia subur memiliki kekebalan penuh.

4. Suplementasi gizi

Pemberian suplementasi gizi bertujuan untuk pencegahan anemia gizi. Pemberian suplementasi gizi untuk pencegahan anemia gizi dilaksanakan dalam bentuk pemberian edukasi gizi seimbang dan tablet tambah darah.

Konsultasi kesehatan

Konsultasi kesehatan berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi.

6. Pelayanan kesehatan lainnya.

Pelayanan kesehatan yang harus diperhatikan dalam skrining prakonsepsi adalah pemeriksaan psikologis. Kondisi psikologis sangat mempengaruhi kehamilan sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus.

D. Konseling Perencanaan Kehamilan Sehat

Konseling Perencanaan kehamilan sehat harus diberikan kepada pasangan yang hendak menikah atau merencanakan kehamilan dengan tujuan untuk mempersiapkan kehamilan sehat sehingga dapat meminimalkan resiko komplikasi saat kehamilan maupun persalinan. Adapun konseling perencanaan kehamilan sehat menurut Kemenkes (2018) pada lembar balik kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin yang diberikan dalam perencanaan kehamilan sehat meliputi sebagai berikut:



1. Persiapan Fisik:

- Pemeriksaan tanda-tanda vital (suhu, nadi, frekuensi nafas, tekanan darah)
- Pemeriksaan status gizi:
 - · Berat badan
- Tinggi badan

2. Persiapan Gizi:

seimbang.

· Lingkar lengan atas (LiLA)

dengan penyebab tersebut.

3. Skrining Status Imunisasi T:

kekebalan penuh.

- Tanda-tanda Anemia
- Pemeriksaan darah rutin:
 Hb, golongan darah dan rhesus
- Pemeriksaan urin rutin
- Pemeriksaan lain atas indikasi seperti: Gula darah, IMS, HIV, Malaria, Thalassemia, Hepatitis B, TORCH (toksoplasmosis, rubella, citomegalovirus dan herpes simpleks), dsb

4. Menjaga kesehatan organ reproduksi

- Sebaiknya pakaian dalam diganti minimal 2 kali sehari.
- Gunakan pakaian dalam berbahan sintetis (katun) yang dapat menyerap keringat dan tidak terlalu ketat.
- Membersihkan organ reproduksi luar dari depan ke belakang dengan menggunakan air bersih dan dikeringkan menggunakan handuk atau tisu.
- Pakailah handuk yang bersih, kering, tidak lembab / bau.
- Khusus untuk perempuan:
 - Tidak boleh terlalu sering menggunakan cairan pembilas vagina
 - Jangan memakai pembalut tipis dalam waktu lama.
 - Pergunakan pembalut ketika menstruasi dan diganti paling lama setiap 4 jam sekali atau setelah buang air.
 - Bagi perempuan yang sering keputihan, berbau dan berwarna harap memeriksakan diri ke petugas kesehatan.
- Bagi laki-laki dianjurkan untuk disunat.



melindungi diri terhadap penyakit Tetanus, sehingga akan memiliki kekebalan seumur hidup untuk melindungi ibu dan bayi terhadap penyakit Tetanus.

Untuk menentukan status imunisasi Tetanus, harus dilakukan skrining

Setiap pasangan catin dianjurkan mengonsumsi makanan bergizi

Setiap catin perempuan dianjurkan mengonsumsi tablet tambah darah

Bagi catin perempuan yang mengalami KEK (Kekurangan Energi Kronis)

dan anemia maka perlu ditentukan penyebabnya dan ditatalaksana sesuai

Pencegahan dan perlindungan diri yang aman terhadap penyakit Tetanus

dilakukan dengan pemberian 5 dosis imunisasi Tetanus untuk mencapai

Catin perempuan perlu mendapat imunisasi Tetanus untuk mencegah dan

(TTD) yang mengandung zat besi dan asam folat seminggu sekali.

Bagi laki-laki dianjurkan untuk disunat.



Gambar 1.1 Persiapan kehamilan

1. Persiapan Fisik

status imunisasi Tetanus pada catin perempuan.


Persiapan fisik meliputi persiapan tanda-tanda vital, pemeriksaan status gizi (TB, BB, IMT, LILA, Tanda-tanda anemia), pemeriksaan golongan darah rutin, pemeriksaan urin rutin, dan pemeriksaan lain atas indikasi seperti gula darah, malaria, TORCH, Hepatitis B, HIV/AIDS, tiroid, dan lain-lain).

2. Persiapan Gizi

KIE persiapan gizi penting untuk dilakukan untuk memastikan calon ibu sudah melakukan perbaikan status gizi sebelum hamil. Pada persiapan gizi terlebih dahulu di ukur status gizi ibu, kemudian bidan menghitung IMT sebagai dasar memberikan konseling gizi seimbang. Dalam persiapan gizi, calon pengantin diedukasi untuk mengkonsumsi asam folat untuk menghindari terjadinya defisiensi asam folat yang dapat menyebabkan gangguan pada masa organogenesis.

Adapun cara pengukuran status gizi dapat dilihat pada gambar berikut :

PENGUKURAN STATUS GIZI







Ukur Tinggi Badan



Ukur Lingkar Lengan Atas (LiLA) (khusus catin perempuan)

Pemeriksaan status gizi pada catin penting untuk mendeteksi secara dini masalah gizi dan menyiapkan calon ibu agar dapat menjalani kehamilan yang sehat

Gambar 2.1 cara pengukuran status gizi


Setelah dilakukan pengukuran timbang berat badan, tinggi badan dan lingkar lengan atas, bidan melakukan penghitungan IMT sebagai dasar dalam memberikan konseling. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut

.

PENGUKURAN STATUS GIZI

- Status gizi dapat ditentukan dengan pengukuran Indek Massa Tubuh (IMT). Untuk catin perempuan ditambah dengan pengukuran Lingkar Lengan Atas (LiLA).
- Status gizi catin perempuan perlu diketahui dalam rangka persiapan kehamilan.
- IMT merupakan proporsi standar berat badan (BB) terhadap tinggi badan (TB). Jika seseorang termasuk kategori:
 - IMT < 17,0: keadaan orang tersebut disebut sangat kurus dengan kekurangan berat badan tingkat berat atau KEK tingkat berat.
 - IMT 17,0 18,5: keadaan orang tersebut disebut kurus dengan kekurangan berat badan tingkat ringan atau KEK tingkat ringan.
- Pengukuran LiLA bertujuan untuk mengetahui adanya risiko Kurang Energi Kronik (KEK). Ambang batas LiLA pada WUS dengan KEK di Indonesia adalah 23,5 cm. Apabila LiLA kurang dari 23,5 cm (bagian merah pita LiLA), artinya catin perempuan mengalami KEK.

· Cara menghitung IMT



Keterangan:

BB = Berat Badan (kg)

TB = Tinggi Badan (m)

Tabel Klasifikasi Nilai IMT

Status Gizi	Kategori	IMT
Sangat kurus	Kekurangan BB tingkat berat	< 17,0
Kurus	Kekurangan BB tingkat ringan	17 - < 18,5
Normal		18,5 - 25,0
Gemuk	Kelebihan BB tingkat ringan	> 25,0 - 27,0
Obesitas	Kelebihan BB tingkat berat	> 27,0



Gambar 3.1 Pengukuran status gizi

Hasil pengukuran status gizi dijadikan dasar oleh bidan untuk memberikan konseling gizi seimbang seperti pada gambar berikut :

TUMPENG GIZI SEIMBANG Basis galas galas dan rifryak Bulanda Inakan 1 sercicle makan 1 sercicle makan Servici bulanda Persepudic Agar tubuh sehat makanlah makanan Sesuai dengan gizi seimbang

Gambar 4.1 Gizi seimbang

GIZI SEIMBANG





- Untuk mendapatkan masukan gizi yang seimbang ke dalam tubuh catin perlu mengonsumsi lima kelompok pangan yang beraneka ragam setiap hari atau setiap kali makan.
- Kelima kelompok pangan tersebut adalah makanan pokok, lauk pauk, sayuran, buahbuahan, dan minuman. Proporsinya dalam setiap kali makan dapat digambarkan dalam ISI PIRINGKU yaitu:
 - · Sepertiga piring berisi makanan pokok
 - · Sepertiga piring berisi sayuran
 - Sepertiga piring berisi lauk pauk dan buah-buahan dalam proporsi yang sama
- Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga agar tubuh tetap sehat:
 - 1.Biasakan minum air putih 8 gelas per hari
 - Hindari minum teh atau kopi setelah makan
 - Batasi mengonsumsi garam, gula, dan lemak/minyak

4 Pilar Gizi Seimbang

Pilar 1 Mengonsumsi pangan beraneka ragam Pilar 2 Membiasakan perilaku hidup bersih Pilar 3 Melakukan aktivitas fisik Pilar 4 Mempertahankan dan memantau berat badan normal

Alasan

- Pilar 1 → Tidak ada satu jenispun pangan yang mempunyai kandungan zat gizi yang lengkap kecuali ASI untuk bayi 0-6 bulan
- Pilar 2 → Adanya hubungan timbal balik antara infeksi dan status nizi
- Pilar 3 → Aktivitas fisik memperlancar sistem metabolisme di dalam tubuh
- Pilar 4 → Merupakan salah satu indikator bahwa telah terjadi keseimbangan gizi di dalam tubuh

Agar tubuh sehat makanlah makanan Sesuai dengan gizi seimbang



Gambar 5.1 Empat pilar gizi seimbang


Berdasarkan gambar di atas, dalam merencanakan kehamilan sehat, calon pengantin/calon ibu harus memahami mengenai gizi seimbang dan menerapkan 4 pilar gizi seimbang dalam kehidupan sehari-hari dan ditambah mengkonsumsi asam folat untuk membantu memenuhi kebutuhan asam folat dalam tubuh. Untuk calon pengantin yang mengalami anemia defisiensi besi, suplementasi Fe sangat dibutuhkan dan perlu dilakukan evaluasi kenaikan kadar Hb sebelum terjadi kehamilan.

Skrining Status Imunisasi TT

Imunisasi TT menjadi salah satu program yang wajib dilakukan oleh calon pengantin sebagai syarat mendaftar menikah. Hal ini merupakan upaya untuk mencegah terjadinya tetanus neonatorum. Adapun penjelasan imunisasi TT tertera pada gambar berikut ini :

IMUNISASI TETANUS





Imunisasi Tetanus pada catin penting untuk mencegah dan melindungi dari penyakit Tetanus baik bagi diri sendiri maupun bayi yang akan dilahirkan kelak.

Status Imunisasi Tetanus pada Catin

Status Imunisasi	Interval Minimal Pemberian	Masa Perlindungan
T1	-	0.70
T2	4 minggu setelah T1	3 tahun
Т3	6 bulan setelah T2	5 tahun
T4	1 tahun setelah T3	10 tahun
T5	1 tahun setelah T4	Lebih dari 25 tahun

Gambar 6.1 Imunisasi Tetanus

IMUNISASI TETANUS



PETUGAS

- Imunisasi Td untuk WUS (Wanita Usia Subur) termasuk ibu hamil dan catin, merupakan imunisasi lanjutan yang terdiri dari imunisasi terhadap penyakit Tetanus dan Difteri.
- Catin perempuan perlu mendapat imunisasi Tetanus untuk mencegah dan melindungi diri terhadap penyakit Tetanus, sehingga akan memiliki kekebalan seumur hidup untuk melindungi ibu dan bayi dari penyakit Tetanus.
- Tiap WUS (15-49 tahun) diharapkan sudah mendapat 5 kali imunisasi Tetanus lengkap (T5).
- Jika status T belum lengkap, maka catin perempuan harus melengkapi status imunisasi Tetanusnya di Puskesmas.
- Sebelum Imunisasi, dilakukan penentuan status Imunisasi T melalui skrining terlebih dahulu. Pemberian Imunisasi Td tidak perlu diberikan, apabila status T sudah mencapai T5, yang harus dibuktikan dengan buku Kesehatan Ibu dan Anak, buku Raport Kesehatanku, kohort dan/atau rekam medis catin yang bersangkutan.

Status Imunisasi Tetanus pada Catin

Status Imunisasi	Interval Minimal Pemberian	Masa Perlindungan
T1	. .	0 = 33
T2	4 minggu setelah T1	3 tahun
T3	6 bulan setelah T2	5 tahun
T4	1 tahun setelah T3	10 tahun
T5	1 tahun setelah T4	Lebih dari 25 tahun

Kriteria penentuan status imunisasi T:

- Bila pada waktu bayi terbukti pernah mendapat DPT-HB-Hib1 dicatat sebagai T1.
- Kemudian mendapat DPT-HB-Hib2 dicatat sebagai T2.
- Kemudian mendapat DPT-HB-Hib pada usia baduta dicatat sebagai T3.
- Sehingga pemberian DT dan Td di sekolah dicatat sebagai T4 dan T5.
- Bila tidak terbukti pernah mendapat suntikan DPT-HB-Hib pada waktu bayi dan Baduta, maka DT dicatat sebagai T1.

Gambar 7.1 Status Imunisasi Tetanus

Berdasarkan gambar di atas, bidan dituntut untuk memiliki keahlian dalam menggali informasi mengenai status imunisasi TT pada calon pengantin.

4. Menjaga Kesehatan Organ Reproduksi

KIE yang dapat diberikan untuk menjaga kesehatan organ reproduksi wanita meliputi :

- a. Menggunakan pakaian dalam berbahan katun menyerap
- b. Cebok dari arah vagina ke dubur
- c. Mengganti pembalut maksimal 4 jam sekali
- d. Tidak perlu menggunakan cairan pembersih vagina terlalu sering
- e. Jangan mengenakn pembalut tipis terlalu sering
- f. Gunakan handuk kering dan bersifat pribadi
- g. Dan lain-lain
- 5. Kondisi Kesehatan Yang Perlu Di Waspadai

Beberapa kondisi kesehatan sebelum hamil harus menjadi perhatian khusus agar tidak mempengaruhi kehamilan. beberapa kondisi kesehatan yang perlu di waspadai akan dijelaskan pada gambar berikut:

a. Anemia

KONDISI KESEHATAN YANG PERLU DIWASPADAI

Young Page Of Secretary

ANEMIA

Anemia adalah kondisi dimana kadar hemoglobin (Hb) di dalam darah kurang dari normal (12 mg/dL).

Anemia sering dialami oleh perempuan karena kurangnya asupan atau konsumsi makanan yang mengandung zat besi, pengaturan pola makan yang salah, gangguan haid/haid abnormal, dan penyakit lainnya (seperti kecacingan, Malaria, dan lainnya).

Tanda anemia antara lain:

- · Lesu, Letih, Lemah, Lelah, Lunglai (5L)
- · Sering mengeluh pusing dan mata berkunang-kunang

Dampak anemia pada ibu hamil (Hb <11 mg/dL), yaitu:

- · Pertumbuhan janin terhambat
- · Bayi berat lahir rendah (BBLR)
- · Bayi lahir sebelum waktunya
- · Bayi mengalami kelainan bawaan
- · Anemia pada bayi yang dilahirkan
- · Risiko perdarahan saat melahirkan

Anemia dapat dicegah dan diatasi dengan:

- · Mengonsumsi makanan bergizi seimbang
- Minum tablet tambah darah (TTD) 1 tablet per minggu sebelum hamil dan 1 tablet per hari selama kehamilan
- Jika ada penyakit yang menyertai, segera ke fasilitas pelayanan kesehatan

KEKURANGAN GEZ

Kondisi kurang gizi dalam keadaan terus menerus dapat mengakibatkan Kurang Energi Kronik (KEK).

Ibu hamil dengan kekurangan gizi memiliki risiko yang dapat membahayakan ibu dan janin antara lain:

- Anemia pada ibu dan janin
- Perdarahan saat melahirkan
- Keguguran
- Mudah terkena penyakit infeksi
- Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)
- Bayi lahir mati
- Kelainan bawaan pada janin

Jika catin perempuan mengalami gizi kurang dan atau anemia, sebaiknya menunda kehamilan dengan ber-KB dan mendapatkan penanganan kesehatan sampai status gizinya baik dan Hb normal (> 12 mg/dL)

LEMBAR PETUGAS 24

Gambar 8.1 Anemia

b. Hepatitis B

PENYAKIT-PENYAKIT YANG PERLU DIWASPADAI

HEPATITIS B



Catin penting mengetahui dan diskrining Hepatitis B karena dapat menular melalui hubungan seksual maupun dari ibu hamil ke bayinya

LEMBAR KLIEN 25

Gambar 9.1 Hepatitis B

PENYAKIT-PENYAKIT YANG PERLU DIWASPADAI

HEPATITIS B

Hepatitis B adalah peradangan hati yang disebabkan oleh virus Hepatitis B.

Virus Hepatitis B dapat ditemukan dalam cairan tubuh penderita seperti produk darah, cairan serebrospinal, cairan vagina dan cairan tubuh lainnya.

Gejala Hepatitis: tidak khas bahkan sering tanpa gejala, ketika muncul gejala seringkali sudah terlambat, sudah sirosis bahkan kanker hati sehingga Hepatitis sering disebut sebagai silent killer. Gejala yang dapat timbul:

Demam

Mual dan muntah

- Kencing berwarna gelap seperti teh
- · Rasa lelah
- · Mata dan kulit kuning

Faktor risiko penularan Hepatitis B:

- Vertikal (95% penularan) : dari ibu hamil pengidap virus Hepatitis B ke bayi yang dikandung atau dilahirkan
- Horizontal (3-5% penularan):
 - Hubungan seksual tidak aman dengan pengidap Hepatitis B
 - · Transfusi darah terkontaminasi virus Hepatitis B
 - Penggunaan jarum suntik bergantian yang terkontaminasi virus Hepatitis B

Pencegahan Hepatitis B pada catin:

- a. Menghindari faktor risiko penularan Hepatitis B
- b, Imunisasi Hepatitis B

Vaksin Hepatitis B diberikan dalam 3 dosis, yaitu pada bulan ke-0, 1 dan 6

Bila sudah terdeteksi Hepatitis B:

- Segera konsultasi ke dokter
- 2. Perlukaan pada kulit harus selalu dibalut
- Tidak berbagi peralatan pribadi seperti pisau cukur, sikat gigi, sisir, gunting kuku dengan orang lain

Catin penting mengetahui dan diskrining Hepatitis B karena dapat menular melalui hubungan seksual maupun dari ibu hamil ke bayinya

> LEMBAR PETUGAS 25



c. Diabetes Mellitus

PENYAKIT-PENYAKIT YANG PERLU DIWASPADAI



DIABETES MELITUS

Diabetes Melitus (DM) merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan peningkatan kadar gula dalam darah ≥ 200 mg/dL (pada pemeriksaan gula darah sewaktu).

Gejala Diabetes Melitus:

- · Trias DM (banyak minum, banyak makan, sering kencing)
- · Mudah lelah dan mengantuk
- Penglihatan kabur
- Penurunan berat badan meskipun nafsu makan mengalami peningkatan
- · Bila terdapat luka lebih sulit sembuh
- · Masalah pada kulit (misalnya gatal-gatal, iritasi dll)


Dampak Diabetes Mellitus dalam kehamilan:

- · Berat badan bayi lahir di atas normal/ bayi lahir besar
- · Bayi berisiko mengalami hiperbilirubinemia (kuning)
- Peningkatan risiko kelahiran prematur (lahir sebelum waktunya)
- · Peningkatan risiko hipertensi dalam kehamilan
- Peningkatan risiko diabetes pada kehamilan berikutnya
- · Bayi berisiko mengidap diabetes saat dewasa

LEMBAR PETUGAS 26

Gambar 10.1 Diabetes Mellitus

d. Malaria dan TORCH



Gambar 11.1 Malaria dan TORCH

PENYAKIT-PENYAKIT YANG PERLU DIWASPADAI



Malaria

Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh sekelompok parasit plasmodium yang hidup dalam sel darah merah.

Penularan Malaria:

Malaria ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi parasit plasmodium. Malaria juga dapat ditularkan melalui transfusi darah yang terkontaminasi parasit plasmodium.

Malaria tidak dapat ditularkan secara kontak langsung dari satu manusia ke manusia lainnya.

Dampak Malaria pada catin:

Malaria bisa menyebabkan anemia pada catin dan kelak dapat mempengaruhi kesehatan ibu hamil dan janinnya. Anemia pada kehamilan dapat menyebabkan keguguran, risiko perdarahan saat melahirkan, bayi lahir sebelum waktunya, dan bayi dengan berat lahir rendah (BBLR).

Pencegahan Malaria pada catin:

- Penggunaan kelambu saat tidur.
- Tutup pintu dan jendela menggunakan kawat/kasa/kelambu nilon.
- Gunakan pakaian pelindung yang menutupi lengan dan kaki saat keluar rumah.
- · Gunakan obat/krim anti nyamuk.

TORCH adalah penyakit yang disebabkan oleh virus <u>Toksoplasma</u>. <u>Rubella</u>, <u>Cytomegalovirus (CMV)</u>, dan <u>Herpes simplex virus II (HSV-II)</u> serta virus jainnya.

Penularan TORCH:

- Penularan aktif: konsumsi makanan dan sayuran yang terkontaminasi virus TORCH dan tidak dimasak sempurna. Makanan/sayuran dapat terkontaminasi virus TORCH dari kotoran hewan seperti kucing, anjing, ayam, burung, dan lain-lain.
- · Penularan pasif: dari ibu hamil pengidap TORCH ke janin.

Dampak TORCH pada catin:

- Infertilitas (baik catin perempuan maupun laki-laki)
- Kelak jika hamil dapat mengakibatkan kecacatan pada janin, misal kelainan saraf, mata, telinga, otak (mikrosefali atau hidrosefalus), kelainan paru-paru, limpa, terganggunya fungsi motorik, dll.

Pencegahan TORCH pada catin:

- Vaksinasi MMR (Mumps Measles Rubella) untuk mencegah komponen Rubella dari TORCH dilakukan 3-6 bulan dari rencana hamil.
- Perilaku hidup bersih dan sehat: cuci tangan pakai sabun, mencuci bahan makanan (sayuran, buah, dan lainnya) dengan air bersih yang mengalir, dan memasak makanan sampai matang sempurna.

Catin penting mengetahui dan diskrining Malaria dan TORCH untuk menyiapkan calon ibu agar dapat menjalani kehamilan dan melahirkan bayi yang sehat

LEMBAR PETUGAS 27

Gambar 12.1 Penjelasan TORCH dan Malaria



e. Penyakit genetik thalasemia

PENYAKIT GENETIK YANG DAPAT MEMPENGARUHI KEHAMILAN DAN KESEHATAN JANIN

THALASSEMIA




Pasangan pembawa sifat Thalassemia berisiko menurunkan penyakit Thalassemia kepada anak kandung dan keturunannya

Orang dengan Thalassemia minor/pembawa sifat tampak sehat dan dapat tidak menunjukkan gejala

LEMBAR KLIEN 28

Gambar 13.1 Thalasemia

PENYAKIT GENETIK YANG DAPAT MEMPENGARUHI KEHAMILAN DAN KESEHATAN JANIN



THALASSEMIA

Thalassemia merupakan penyakit kelainan sel darah merah akibat kekurangan protein pembentuk sel darah merah yang menyebabkan sel darah merah mudah pecah, sehingga penderita mengalami kurang darah berat yang dapat mengancam jiwa. Penyakit ini diturunkan oleh kedua orang tua pembawa sifat Thalassemia kepada anak kandung dan keturunannya.

Terdapat 2 jenis Thalassemia yaitu Thalassemia Minor dan Thalassemia Mayor. Orang dengan Thalassemia Minor/ pembawa sifat tampak sehat dan dapat tidak menunjukkan gejala. Sedangkan orang dengan Thalassemia Mayor memerlukan pengobatan dan transfusi darah rutin seumur hidup serta memiliki usia harapan hidup yang relatif pendek.

Deteksi dini Thalassemia pada catin:

- Memiliki riwayat penyakit keluarga dengan anemia atau pasien Thalassemia
- · Pucat dan lemah
- · Riwayat transfusi berulang
- · Pemeriksaan darah dan analisis Hb

Dampak Thalassemia pada catin:

Jika kedua pasangan catin merupakan pembawa sifat Thalassemia dan kelak hamil, maka berisiko (25%) melahirkan anak dengan Thalassemia Mayor,

Pencegahan Thalassemia bagi catin:

Program pengelolaan penyakit Thalassemia pada catin ditujukan untuk mencegah kelahiran anak dengan Thalassemia Mayor, melalui:

- Skrining Thalassemia sedini mungkin atau sebelum menikah pada catin laki-laki dan perempuan untuk mengetahui apakah pasangan catin merupakan pembawa sifat Thalassemia.
- Jika kedua pasangan catin pembawa sifat Thalassemia memutuskan untuk tetap menikah, anjurkan untuk menghindari kehamilan dengan selalu menggunakan kontrasepsi.

Pasangan pembawa sifat Thalassemia berisiko menurunkan penyakit Thalassemia kepada anak kandung dan keturunannya


Orang dengan Thalassemia minor/pembawa sifat tampak sehat dan dapat tidak menunjukkan gejala

LEMBAR PETUGAS 28

Gambar 14.1 penjelasan thalasemia


f. Penyakit genetik hemofilia












Apabila salah satu pasangan adalah penderita atau pembawa sifat Hemofilia maka berisiko menurunkan penyakit Hemofilia kepada anak kandung dan keturunannya

Orang dengan Hemofilia tampak sehat dan dapat tidak menunjukkan gejala

LEMBAR KLIEN 29

Gambar 15.1 Hemofilia

PENYAKIT GENETIK YANG DAPAT MEMPENGARUHI KEHAMILAN DAN KESEHATAN JANIN



HEMOFILIA

Hemofilia adalah penyakit/gangguan faktor pembekuan darah dalam tubuh yang menyebabkan perdarahan sulit berhenti atau berlangsung lebih lama.

Penyakit ini diturunkan oleh salah satu atau kedua orang tua kepada anak kandung dan keturunannya.

Pada wanita, kelainan ini bersifat resesif sebagai pembawa sifat sedangkan pada laki-laki dapat muncul gejala ringan hingga berat.

Gejala Hemofilia:

- Perdarahan sulit berhenti atau berlangsung lebih lama misal pada luka, cedera, operasi, cabut gigi, pasca suntikan, dan pasca imunisasi suntik. Tingkat keparahan tergantung dari jumlah faktor pembekuan di dalam darah.
- Gejala lain berupa memar pada kulit bila terbentur, persendian bengkak dan nyeri, mimisan, sering muntah, sakit kepala, cepat lelah, dan penglihatan ganda.

Dampak Hemofilia pada catin:

Jika salah satu catin merupakan pembawa sifat atau penderita Hemofilia dan kelak hamil, maka berisiko melahirkan anak laki-laki dengan Hemofilia atau anak perempuan pembawa sifat Hemofilia.

Pencegahan Hemofilia bagi catin:

Untuk mencegah risiko kelahiran anak dengan Hemofilia dilakukan:

- Skrining Hemofilia sedini mungkin atau sebelum menikah pada catin laki-laki dan perempuan untuk mengetahui apakah pasangan catin merupakan pembawa sifat atau penderita Hemofilia.
- Jika salah satu catin merupakan pembawa sifat atau penderita Hemofilia memutuskan untuk tetap menikah, anjurkan penggunaan kontrasepsi untuk menghindari kehamilan.

Apabila salah satu pasangan adalah penderita atau pembawa sifat Hemofilia maka berisiko menurunkan penyakit Hemofilia kepada anak kandung dan keturunannya

Orang dengan Hemofilia tampak sehat dan dapat tidak menunjukkan gejala

LEMBAR PETUGAS 29

Gambar 16.1 Penjelasan hemofilia STANDAR OPERATING PROSEDUR

PRODI	KIE PERSIAPAN KEHAMILAN SEHAT			
KEBIDANAN	NO DOKUMEN	NO REVISI	HALAMAN	
PROGRAM				
PROFESI				
PROSEDUR	TANGGAL	DITETA	PKAN OLEH	
TETAP	DITETAPKAN			
		()	
Pengertian	Memberikan konseling	•	• •	
	sehat agar terjadi peru		•	
	pengantin / calon oran	g tua untuk mem	persiapkan kehamilan	
	dengan baik.			
Indikasi	Untuk semua calon pe	engantin/pasangan	yang merencanakan	
	kehamilan			
Tujuan	1. Untuk mempersiapkar	n kehamilan sehat	tanpa komplikasi	
Petugas	Mahasiswa Kebidanan		•	
Skenario	Seorang perempuan	datang ke F	Puskesmas bersama	
	pasangannya untuk	berkonsultasi me	ngenai perencanaan	
	kehamilan.			
Pengkajian	Mengkaji keadaan umun	n pasien		
Persiapan pasien	Menjelaskan tujuan dilak	ukan KIE		
Persiapan ruang	Persiapan ruang			
dan alat	1. Ruangan yang nyama	ın dan tertutup		
	2. Tenang dan jauh dari	keramaian		
	3. Ventilasi cukup			
	Persiapan Alat			
	1. Timbangan			
	2. Pengukur tinggi badar	1		
	3. Pengukur lila			
	4. Food model			
	5. Lembar balik			
	6. dokumentasi			
Langkah langkah	7. Bolpoin 1. Menjelaskan tujuan Kl	IE nada salah nana	rantin/aalan ihu	
Langkah-langkah	Melakukan pemeriksa		gantin/calon ibu	
	Menghitung IMT catin	•	nacil norhitungan	
	4. Menjelaskan setiap	•		
	makanan gizi seimban	-	aritak mengkensamsi	
		setiap catin p	erempuan dianjurkan	
		tambah darah yang mengandung zat besi		
	dan asam folat minima			
	6. Menjelaskan manfaat i			
	7. Menjelaskan jangka wa		unisasi TT	
	8. Menjelaskan mengena			
	9. Menjelaskan mengena	ii kekurangan gizi d	dan bahayanya	

	10.	Menjelaskan	mengenai	hepatitis	В	dan	upaya
	pen	cegahan pada ca	atin				
	11.	Menjelaskan m	engenai dial	oetes melitu	ıs dar	n resiko	onya
	12.	Menjelaskan mengenai malaria dan dampaknya bagi catin					
	13.	Menjelaskan r	mengenai T	ORCH dan	n dar	mpakny	/a bagi
	catir	า					
	14.	Menjelaskan m	nengenai tha	lasemia da	n daı	mpakny	/a pada
	catir	า					
	15.	Menjelaskan m	nengenai pen	cegahan th	alase	emia ba	ıgi catin
	16.	Menjelaskan n	nengenai he	mofilia dan	ı dar	npakny	a pada
	catir	า					
	17.	Menjelaskan m	nengenai pen	cegahan he	emofi	lia pad	a catin
Referensi	1. Ker	nenterian Keseh	atan Republ	lik Indonesia	a. 20	18. Ke	sehatan
	Rep	oroduksi Dan Sel	ksual Bagi C	alon Penga	ntin		

Petunjuk penilaian:

- 0 = tidak dilakukan
- 1 = dilakukan tidak sempurna
- 2 = dilakukan dengan sempurna

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI		
Α	SIKAP DAN PERILAKU	0	1	2
1	Menyambut pasien dengan sopan dan ramah			
2	Memperkenalkan diri kepada pasien			
3	Menjelaskan prosedur yang akan dilaksanakan			
4	Menjaga privasi pasien			
5	Tanggap terhadap reaksi pasien dan kontak mata			
	Score :10			
В	ISI/KONTEN			
	Persiapan gizi			
6	Menghitung IMT catin dan menjelaskan hasil			
	perhitungan			
7	Menjelaskan setiap pasangan catin untuk			
	mengkonsumsi makanan gizi seimbang			
8	Menjelaskan bahwa setiap catin perempuan dianjurkan			
	mengkonsumsi tablet tambah darah yang mengandung			
	zat besi dan asam folat minimal seminggu sekali			
	Persiapan imunisasi			
9	Menjelaskan manfaat imunisasi TT			
10	Menjelaskan jangka waktu pemberian imunisasi TT			
	Konseling kondisi kesehatan yang perlu diwaspadai			
11	Menjelaskan mengenai anemia dan bahayanya			
12	Menjelaskan mengenai kekurangan gizi dan bahayanya			
13	Menjelaskan mengenai hepatitis B dan upaya			
	pencegahan pada catin			
14	Menjelaskan mengenai diabetes melitus dan resikonya			
15	Menjelaskan mengenai malaria dan dampaknya bagi			
	catin			
16	Menjelaskan mengenai TORCH dan dampaknya bagi			
	catin			
	Konseling penyakit genetik yang dapat			
	mempengaruhi kehamilan dan kesehatan janin			
17	Menjelaskan mengenai thalasemia dan dampaknya			
	pada catin			
18	Menjelaskan mengenai pencegahan thalasemia bagi			
	catin			
19	Menjelaskan mengenai hemofilia dan dampaknya pada			
	catin		1	

20	Menjelaskan mengenai pencegahan hemofilia pada	
	catin	
	Score: 30	
С	TEKNIK	
21	Teruji melaksanakan secara sistematis	
22	Teruji menggunakan bahasa yang mudah dimengerti	
23	Teruji memberikan perhatian terhadap respon pasien	
24	Teruji melaksanakan dengan percaya diri dan tidak	
	ragu-ragu	
25	Teruji mendokumentasikan hasil	
	Score: 10	
	Total Score : 50	

Nilai akhir = (Total score :50) x 100

MATERI 2 ANAMNESA PRANIKAH DAN PRAKONSEPSI

STANDAR OPERATING PROSEDUR

PRODI	ANAMNESA PRANIKAH DAN PRAKONSEPSI					
KEBIDANAN						
PROGRAM	NO DOKUMEN	DOKUMEN NO REVISI HALAMAN				
PROFESI						
PROSEDUR	TANGGAL	DITETA	PKAN OLEH			
TETAP	DITETAPKAN		,			
D	п	<u> </u>)			
Pengertian	mengumpulkan informa	•	· ·			
	kehamilan yang dapa	•	-			
	•	ntuk menentuka	١			
Indikasi	mengembangkan rencar Untuk semua calon pe	•	, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>			
IIIUIKasi	kehamilan	enganiin/pasangan	yang merencanakan			
	Kenamian					
Tujuan	2. Untuk mengetahui kes	sehatan sebelum h	amil			
Petugas	Mahasiswa Kebidanan					
Skenario	Seorang perempuan	•	Puskesmas bersama			
	pasangannya membawa	ı pengantar dari KU	JA untuk mendapatkan			
	layanan pranikah.					
Pengkajian	Mengkaji keadaan umun					
Persiapan pasien	Menjelaskan tujuan dilak	kukan anamnesa				
Persiapan ruang	Persiapan ruang					
dan alat	4. Ruangan yang nyama	•				
	5. Tenang dan jauh dari	keramaian				
	6. Ventilasi cukup					
	Persiapan Alat					
	8. Lembar dokumentasi					
Langkah-langkah	Bolpoin Menjelaskan tujuan	anamnosa nada	calon pangantin/calon			
Langkan-langkan	ibu	anamnesa paua	caion pengantin/caion			
	2. Melakukan anamnes	a pada ibu meliputi				
		titas pasien dan su				
	b. Menanyakan kelul					
	· ·	•	naan kehamilan yang			
	pertama/pernikaha					
	d. Mengkaji ulang	atau menanyaka	n mengenai riwayat			
	kehamilan terdahu	ulu tentang paritas				
	e. Mengkaji riwayat k	kontrasepsi				
		•	mengenai menstruasi			
	<u>-</u>	dan masalah sep	outar menstruasi dan			
	keputihan					
		penyakit seperti I	DM, asma, hipertensi,			
	jantung					

	h. Mengkaji penyakit genetik pada keluarga ibu maupun
	suami seperti thalasemia,hemofilia, lupus
	i. Mengkaji riwayat penyakit menular seperti hepatitis B,
	TORCH, HIV atau IMS lainnya
	j. Mengkaji pola nutrisi pada ibu
	k. Mengkaji personal hygine pada ibu
	I. Mengkaji kebiasaan mengkonsumsi minuman keras pada
	ibu maupun suami
	m. Mengkaji kebiasaan merokok pada ibu maupun suami
	n. Mengkaji penggunaan NAFZA pada ibu maupun suami
	o. Mengkaji riwayat imunisasi TT pada ibu
	p. Mengkaji upaya yang sudah dilakukan ibu dalam persiapan
	pranikah dan prakonsepsi
Referensi	2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2018. Kesehatan
	Reproduksi Dan Seksual Bagi Calon Pengantin

Petunjuk penilaian:

- 0 = tidak dilakukan
- 1 = dilakukan tidak sempurna
- 2 = dilakukan dengan sempurna

NO	BUTIR YANG DINILAI	NILAI		
Α	SIKAP DAN PERILAKU	0	1	2
1	Menyambut pasien dengan sopan dan ramah			
2	Memperkenalkan diri kepada pasien			
3	Menjelaskan prosedur yang akan dilaksanakan			
4	Menjaga privasi pasien			
5	Tanggap terhadap reaksi pasien dan kontak mata			
	Score :10			
В	CONTENT/ISI			
6	Menanyakan identitas pasien dan suami			
7	Menanyakan keluhan pada ibu			
8	Menanyakan apakah ini perencanaan kehamilan yang pertama/pernikahan yang pertama			
9	Mengkaji ulang atau menanyakan mengenai riwayat kehamilan terdahulu tentang paritas			
10	Mengkaji riwayat kontrasepsi			
11	Mengkaji ulang dan menanyakan mengenai menstruasi meliputi HPHT dan masalah seputar menstruasi dan keputihan			
12	Mengkaji riwayat penyakit seperti DM, asma, hipertensi, jantung			
13	Mengkaji penyakit genetik pada keluarga ibu maupun suami			
4.4	seperti thalasemia,hemofilia, lupus			
14	Mengkaji riwayat penyakit menular seperti hepatitis B, TORCH, HIV atau IMS lainnya			
15	Mengkaji pola nutrisi pada ibu			
16	Mengkaji personal hygine pada ibu			
17	Mengkaji kebiasaan mengkonsumsi minuman keras pada ibu maupun suami			
18	Mengkaji kebiasaan merokok pada ibu maupun suami			
19	Mengkaji penggunaan NAFZA pada ibu maupun suami			
20	Mengkaji riwayat imunisasi TT pada ibu			
21	Mengkaji upaya yang sudah dilakukan ibu dalam persiapan			
	pranikah dan prakonsepsi			
	Score: 32			
С	TEKNIK			
22	Teruji melaksanakan secara sistematis			
23	Teruji menggunakan bahasa yang mudah dimengerti			
24	Teruji memberikan perhatian terhadap respon pasien			
25	Teruji melaksanakan dengan percaya diri dan tidak ragu-ragu			
26	Teruji mendokumentasikan hasil			

Score : 10		
Total Score : 52		

Nilai akhir = (Total score :52) x 100

SERVIKS UNTUK MENGENAL MASA SUBUR

A. KURVA SUHU BASAL

1. Cara kerja

Suhu tubuh basal adalah suhu terendah yang dicapai oleh tubuh selama istirahat atau dalam keadaan istirahat (tidur). Pengukuran suhu basal dilakukan pada pagi hari segera setelah bangun tidur dan sebelum melakukan aktivitas lainnya. Tujuan pencatatan suhu basal untuk mengetahui kapan terjadinya masa subur/ovulasi. Suhu basal tubuh diukur dengan alat yang berupa termometer basal. Termometer basal ini dapat digunakan secara oral, per vagina, atau melalui dubur dan ditempatkan pada lokasi serta waktu yang sama selama 5 menit.

Suhu normal tubuh sekitar 35,5-36 derajat Celcius. Pada waktu ovulasi, suhu akan turun terlebih dahulu dan naik menjadi 37-38 derajat kemudian tidak akan kembali pada suhu 35 derajat Celcius. Pada saat itulah terjadi masa subur/ovulasi. Kondisi kenaikan suhu tubuh ini akan terjadi sekitar 3-4 hari, kemudian akan turun kembali sekitar 2 derajat dan akhirnya kembali pada suhu tubuh normal sebelum menstruasi. Hal ini terjadi karena produksi progesteron menurun.

Apabila grafik (hasil catatan suhu tubuh) tidak terjadi kenaikan suhu tubuh, kemungkinan tidak terjadi masa subur/ovulasi sehingga tidak terjadi kenaikan suhu tubuh. Hal ini terjadi dikarenakan tidak adanya korpus luteum yang memproduksi progesteron. Begitu sebaliknya, jika terjadi kenaikan suhu tubuh dan terus berlangsung setelah masa subur/ovulasi kemungkinan terjadi kehamilan. Karena, bila sel telur/ovum berhasil dibuahi, maka korpus luteum akan terus memproduksi hormon progesteron. Akibatnya suhu tubuh tetap tinggi.

2. Manfaat

Metode suhu basal tubuh berguna bagi pasangan yang menginginkan kehamilan.

3. Efektifitas

Metode suhu basal tubuh akan efektif bila dilakukan dengan benar dan konsisten. Suhu tubuh basal dipantau dan dicatat selama beberapa bulan berturut-turut dan dianggap akurat bila terdeteksi pada saat ovulasi. Tingkat keefektian metode suhu tubuh basal sekitar 80 persen atau 20-30 kehamilan per 100 wanita per tahun. Secara teoritis angka kegagalannya adalah 15 kehamilan per 100 wanita per tahun. Metode suhu basal tubuh akan jauh lebih efektif apabila dikombinasikan dengan metode kontrasepsi lain seperti kondom, spermisida ataupun metode kalender atau pantang berkala (calender method or periodic abstinence).

- 4. Faktor Yang Mempengaruhi Keandalan Metode Suhu Basal
 - a. Penyakit.

- b. Gangguan tidur.
- c. Merokok dan atau minum alkohol.
- d. Penggunaan obat-obatan ataupun narkoba.
- e. Stres.
- f. Penggunaan selimut elektrik.

5. Keuntungan

- a. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pada pasangan suami istri tentang masa subur/ovulasi.
- b. Membantu wanita yang mengalami siklus haid tidak teratur mendeteksi masa subur/ovulasi.
- c. Dapat digunakan sebagai kontrasepsi ataupun meningkatkan kesempatan untuk hamil.
- d. Membantu menunjukkan perubahan tubuh lain pada saat mengalami masa subur/ovulasi seperti perubahan lendir serviks.
- e. Metode suhu basal tubuh yang mengendalikan adalah wanita itu sendiri.

6. Kekurangan

- a. Membutuhkan motivasi dari pasangan suami istri.
- b. Memerlukan konseling dan KIE dari tenaga medis.
- c. Suhu tubuh basal dapat dipengaruhi oleh penyakit, gangguan tidur, merokok, alkohol, stres, penggunaan narkoba maupun selimut elektrik.
- d. Pengukuran suhu tubuh harus dilakukan pada waktu yang sama.
- e. Tidak mendeteksi awal masa subur.
- f. Membutuhkan masa pantang yang lama.

7. Cara mengukur suhu

- a. Mengukur suhu pada waktu yang hampir sama setiap pagi (sebelum bangkit dari tempat tidur) dan mencatat suhu ibu pada kartu yang telah disediakan
- b. Memakai catatan suhu pada kartu tersebut untuk 10 hari pertama dari siklus haid untuk menentukan suhu tertinggi dari suhu yang normal, rendah. Mengabaikan suhu tinggi yang disebabkan oleh demam atau gangguan lain.
- c. Menarik garis pada 0,05°C 0,1°C di atas suhu tertinggi dari 10 suhu 10 hari tersebut. Ini dinamakan garis pelindung (cover line) atau garis suhu.
- d. Masa tak subur mulai pada sore setelah hari ketiga berturut-turut suhu berada di atas garis pelindung tersebut.

Catatan:

 Jika salah satu dari 3 suhu tersebut di bawah garis pelindung (cover line) selama perhitungan 3 hari, ini mungkin tanda bahwa ovulasi belum terjadi. Untuk menghindari kehamilan menunggu sampai 3 hari berturu-turut suhu tersebut di atas garis pelindung sebelum memulai senggama.

2) Ketika mulai masa tak subur, tidak perlu untuk mencatat suhu basal ibu. Ibu dapat berhenti mencatat sampai haid berikut mulai dan bersenggama sampai hari pertama haid berikutnya.

8. PEMERIKSAAN MUCUS SERVIKS

1. Pengertian

Pemeriksaan mucus serviks dilakukan dengan cara mengenali masa subur dari siklus menstruasi dengan mengamati lendir serviks dan perubahan rasa pada vulva menjelang hari-hari ovulasi. Metode lendir serviks adalah metode mengamati kualitas dan kuantitas lendir serviks setiap hari. Periode subur ditandai dengan lendir yang jernih, encer, dan licin.

2. Cara kerja

Pengamatan lendir serviks dapat dilakukan dengan merasakan perubahan rasa pada vulva sepanjang hari dan melihat langsung lendir pada waktu tertentu. Menjelang ovulasi lendir ini akan mengandung banyak air (encer) sehingga mudah dilalui sperma. Setelah ovulasi lendir kembali menjadi lebih padat. Jika lendir mulai keluar atau bagi wanita yang mengalami keputihan (sering mengeluarkan lendir) lendir mengencer, bergumpal-gumpal dan lengket, hal ini menunjukan akan terjadi ovulasi. Pada puncak masa subur, yaitu menjelang dan pada saat ovulasi lendir akan keluar dalam jumlah lebih banyak menjadi transparan, encer dan bening seperti putih telur dan dapat ditarik diantara dua jari seperti benang. Sehingga ini adalah waktu terbaik untuk senggama bila hendak merencanakan kehamilan.

Lendir dari serviks tidak dapat diamati pada saat sedang terangsang dan beberapa jam setelah senggama, karena dinding vagina juga akan mengeluarkan lendir yang akan memalsukan lendir serviks.

3. Manfaat

Metode mucus serviks bermanfaat untuk mencegah kehamilan yaitu dengan berpantang senggama pada masa subur. Selain itu, metode ini juga bermanfaat bagi wanita yang menginginkan kehamilan.

4. Kelebihan

- a. Mudah digunakan.
- b. Tidak memerlukan biaya
- c. Metode mucus serviks merupakan metode keluarga berencana alami lain yang mengamati tanda-tanda kesuburan.

Kekurangan

- a. Tidak efektif bila digunakan sendiri, sebaiknya dikombinasikan
- b. Tidak cocok untuk wanita yang tidak menyukai menyentuh alat kelaminnya.

- c. Wanita yang memiliki infeksi saluran reproduksi dapat mengaburkan tanda-tanda kesuburan.
- d. Wanita yang menghasilkan sedikit lendir.

6. Indikasi

- a. Semua perempuan semasa reproduksi, baik siklus haid teratur maupun tidak teratur, tidak haid baik karena menyusui maupun pramenopause.
- b. Semua perempuan dengan paritas berapa pun termasuk nulipara.
- c. Perempuan kurus atau gemuk.
- d. Perempuan yang merokok.
- e. Perempuan dengan alasan kesehatan tertentu seperti hipertensi sedang, varises, dismenorea, sakit kepala sedang atau hebat, mioma uteri, endometritis, kista ovarii, anemia defisiensi besi, hepatitis virus, malaria, trombosis vena dalam, atau emboli paru
- f. Pasangan yang ingin dan termotivasi untuk mengobservasi, mencatat, dan menilai tanda dan gejala kesuburan.

7. Kontraindikasi

- a. Perempuan yang dari segi umur, paritas atau masalah kesehatannya membuat kehamilan menjadi suatu kondisi risiko tinggi.
- b. Perempuan sebelum mendapat haid (menyusui, segera setelah abortus)
- c. Perempuan dengan siklus haid yang tidak teratur
- d. Perempuan yang pasangannya tidak mau bekerjasama
- e. Perempuan yang tidak suka menyentuh daerah genitalianya

PRODI	PENDIDIKAN KESEHATAN METODE LENDIR SERVIKS			
KEBIDANAN				
PROGRAM	NO DOKUMEN	NO REVISI	HALAMAN	
PROFESI				
PROSEDUR	TANGGAL	DITETAPKAN OLEH		
TETAP	DITETAPKAN			
		()	
Pengertian	Memberikan pendidikan	kesehatan metod	e lender serviks untuk	
	mengetahui kesuburan pada pasangan yang hendak			
	merencanakan kehamilan			
Indikasi	Untuk semua calon pe	engantin/pasangan	yang merencanakan	
	kehamilan			
Tuinen				
Tujuan	_	subur berdasarkai	n lendir serviks	
Petugas	Mahasiswa Kebidanan			
Skenario	Seorang perempuan datang ke PMB untuk berkonsultasi			
	mengenai cara mengetahui masa subur.			
Pengkajian	Mengkaji cara mengetahui masa subur			
Persiapan pasien	Menjelaskan tujuan dilakukan pendidikan kesehatan metode			
	lendir serviks			
Persiapan ruang	Persiapan ruang			
dan alat	Ruangan yang nyaman dan tertutup			
	2. Tenang dan jauh dari keramaian			
	3. Ventilasi cukup			
	Persiapan Alat			
	Lembar dokumentasi			
	2. Bolpoin			
	3. Lembar balik			
Langkah-langkah	1. Menjelaskan tujuan p		•	
	Menjelaskan pengertian metode lendir serviks			
	3. Menjelaskan syarat-syarat yang boleh melakukan metode			
	lendir serviks			
	4. Menjelaskan manfaat metode lendir serviks			
	5. Menjelaskan menentukan waktu yang tepat untuk senggama			
	6. Menjelaskan kelebihan metode lendir serviks			
	7. Menjelaskan kekurangan metode lendir serviks			
	8. Memberikan kesempatan klien untuk menanyakan hal – hal			
	yang belum jelas			
Referensi	3. Kementerian Kesehat	an Republik Indon	esia. 2018. Kesehatan	
	Reproduksi Dan Seks	ual Bagi Calon Per	ngantin	

CEKLIST PENDIDIKAN KESEHATAN METODE LENDIR SERVIKS

Nilai 0 : Jika Tidak Dilakukan

Nilai 1 : Dilakukan Kurang Sempurna Nilai 2 : Dilakukan Dengan Sempurna

NO	BUTIR YANG DINILAI		NILAI		
NO			1	2	
Α	SIKAP DAN PERILAKU				
1	Menyambut pasien dengan sopan dan ramah				
2	Memperkenalkan diri pada pasien				
3	Mempersilahkan pasien duduk				
4	Menunjukkan rasa empati				
5	Menjaga privasi pasien				
	Score: 10				
В	CONTENT				
1	Menjelaskan tujuan				
2	Menjelaskan pengertian metode lendir serviks				
3	Menjelaskan syarat-syarat yang boleh melakukan metode lendir serviks				
4	Menjelaskan manfaat metode lendir serviks				
5	Menjelaskan menentukan waktu yang tepat untuk senggama				
6	Menjelaskan kelebihan metode lendir serviks				
7	Menjelaskan kekurangan metode lendir serviks				
8	Memberikan kesempatan klien untuk menanyakan hal – hal yang belum jelas				
	Score: 16				
C.	TEKNIK				
1	Melaksanakan pendidikan kesehatan secara sistematis				
2	Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti				
3	Tanggap terhadap reaksi pasien				
4	Melaksanakan tindakan dengan percaya diri				
5	Mendokumentasikan hasil tindakan				
	Score: 10				
	Total Score : 36				
	NILAI AKHIR : (Total Score/36) x 100				

CEKLIST PENDIDIKAN KESEHATAN METODE SUHU BASAL

Nilai 0 : Jika Tidak Dilakukan

Nilai 1 : Dilakukan Kurang Sempurna Nilai 2 : Dilakukan Dengan Sempurna

NO	LANGKAH		NILAI		
NO			1	2	
Α	SIKAP DAN PERILAKU				
1	Menyambut pasien dengan sopan dan ramah				
2	Memperkenalkan diri pada pasien				
3	Mempersilahkan pasien duduk				
4	Menunjukkan rasa empati				
5	Menjaga privasi pasien				
	Score: 10				
В	CONTENT				
1	Menjelaskan tujuan konseling				
2	Menjelaskan pengertian metode suhu basal				
3	Menjelaskan syarat-syarat yang boleh melakukan metode suhu basal				
4	Menjelaskan manfaat metode suhu basal				
5	Menjelaskan efektifitas metode suhu basal				
6	Menjelaskan cara menerapkan aturan perubahan suhu				
7	Menjelaskan menentukan waktu yang tepat untuk senggama				
8	Memberikan kesempatan klien untuk menanyakan hal – hal yang belum jelas				
	Score : 16				
C.	TEKNIK				
1	Melaksanakan konseling secara sistematis				
2	Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti				
3	Tanggap terhadap reaksi pasien				
4	Melaksanakan tindakan dengan percaya diri				
5	Mendokumentasikan hasil tindakan				
	Score : 10				
	Total Score : 36				
	NILAI AKHIR : (Total Score/36) x 100				

MATERI 5

KIE PERSIAPAN MENJADI ORANG TUA

STANDAR OPERATING PROSEDUR

PRODI	KIE PERSIAPAN MENJADI ORANG TUA				
KEBIDANAN	NO DOKUMEN	NO REVISI	HALAMAN		
PROGRAM					
PROFESI					
PROSEDUR	TANGGAL	DITETAPKAN OLEH			
TETAP	DITETAPKAN				
		()		
Pengertian	Memberikan informasi	informasi kepada pasangan yang merencanakan			
	kehamilan mengenai persiapan menjadi orang tua				
Indikasi	Untuk semua pasangan	yang merencanakan kehamilan			
Tujuan	Untuk meningkatkan per	engetahuan pasangan mengenai kesiapan			
	menjadi orang tua				
Petugas	Petugas Mahasiswa Kebidanan				
Skenario	Seorang perempuan	ian datang ke Puskesmas bersama			
	pasangannya untuk melakukan konsultasi perencanaan				
	kehamilan				
Pengkajian	Mengkaji keadaan umum pasien				
Persiapan pasien	Menjelaskan tujuan dilakukan KIE				
Persiapan ruang	Persiapan ruang				
dan alat	Ruangan yang nyaman dan tertutup				
	2. Tenang dan jauh dari keramaian				
	3. Ventilasi cukup				
	Persiapan Alat				
	1. Lembar balik				
	2. Bolpoin				
Langkah-langkah	1. Menyambut klien dengan ramah				
	2. Mengucapkan salam				
	3. Meperkenalkan diri				
	4. Meyakinkan bahwa p	orivasi dan keraha	isiaan klien di hormati		
	dan dijaga				
	5. Menjelaskan tujuan KIE pada pasangan				
	6. Melakukan KIE persiapan menjadi orangtua pada pasangan				
	meliputi :				
	a. Persiapan fisik				
	b. Persiapan mental				
	c. Persiapan ekonomi				
	d. Kesetaraan gender dalam rumah tangga dalam hal berbagi peran menjadi orangtua				
Referensi					
Veieleliai		ementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2018. Kesehatan			
	Reproduksi Dan Seksual Bagi Calon Pengantin				

CEKLIST KIE PERSIAPAN MENJADI ORANGTUA

Petunjuk penilaian:

0 = tidak dilakukan

1 = dilakukan tidak sempurna

2 = dilakukan dengan sempurna

NO	BUTIR YANG DINILAI	NILAI				
Α	SIKAP DAN PERILAKU	0	1	2		
1	Menyambut pasien dengan sopan dan ramah					
2	Memperkenalkan diri kepada pasien					
3	Menjelaskan prosedur yang akan dilaksanakan					
4	Menjaga privasi pasien					
5	Tanggap terhadap reaksi pasien dan kontak mata					
	Score :10					
В	CONTENT/ISI					
6	Menanyakan identitas pasien dan suami					
7	Menanyakan alasan berkunjung					
8	Menjelaskan tujuan KIE persiapan menjadi orang tua					
	Persiapan fisik					
9	Memberikan KIE usia yang ideal untuk menjadi orangtua					
10	Memberikan KIE persiapan gizi pada calon ayah maupun					
	calon ibu					
11	Memberikan KIE persiapan imunisasi pada calon ibu					
12	Memberikan KIE gaya hidup sehat pada calon orang tua					
	Persiapan mental					
13	Memberikan KIE adaptasi psikologis pada kehamilan kepada					
	calon orangtua					
	Persiapan ekonomi					
14	Menjelaskan hal-hal yang harus disiapkan berkaitan dengan					
	ekonomi sebagai persiapan menjadi orang tua meliputi					
	kebutuhan saat hamil, bersalin, imunisasi anak dan perawatan					
	anak					
	Kesetaraan gender dalam persiapan menjadi orangtua					
15	Memberikan KIE mengenai peran suami dan istri dalam					
	keluarga					
16	Memberikan KIE mengenai peran ayah dan ibu bagi anak					
	Score : 22					
С	TEKNIK					
1	Teruji melaksanakan secara sistematis					
2	Teruji menggunakan bahasa yang mudah dimengerti					
3	Teruji memberikan perhatian terhadap respon pasien					
4	Teruji melaksanakan dengan percaya diri dan tidak ragu-ragu					
5	Teruji mendokumentasikan hasil					
	Score: 10					
	Total Score : 42					

Nilai akhir = (Total score :42) x 100

MATERI 6 MELAKUKAN SKRINNING CA CERVIX DENGAN IVA

A. Kanker Leher Rahim (Ca Cervix)

Kanker Leher Rahim adalah keganasan yang terjadi pada leher rahim yang merupakan bagian terendah dari rahim yang menonjol ke puncak liang senggama. Epitel leher rahim terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu epitel skuamosa dan epitel kolumnar. Daerah pertemuan kedua jenis epitel disebut Sambungan Skuamosa-Kolumnar (SSK) dan letaknya dipengaruhi oleh faktor hormonal yang berkaitan dengan umur, aktivitas seksual dan paritas. Pada perempuan berusia sangat muda dan menopause, SSK terletak di dalam ostium. Sedangkan pada perempuan usia reproduksi/seksual aktif, SSK terletak di ostium eksternum karena trauma atau retraksi otot oleh prostaglandin.

Pada masa kehidupan perempuan terjadi perubahan fisiologis pada epitel leher rahim, epitel kolumnar akan digantikan oleh epitel skuamosa yang diduga berasal dari cadangan epitel kolumnar. Proses pergantian epitel kolumnar menjadi epitel skuamosa disebut proses metaplasia dan terjadi akibat pengaruh pH vagina yang rendah. Aktivitas metaplasia yang tinggi sering dijumpai pada masa pubertas. Akibat dari proses metaplasia ini maka secara morfogenik terdapat 2 (dua) SSK, yaitu SSK asli dan SSK baru yang menjadi tempat pertemuan antara epitel skuamosa baru dengan epitel kolumnar. Daerah di antara kedua SSK disebut daerah transformasi.

B. Perjalanan Penyakit

Infeksi Human Papilloma Virus (HPV) atau Virus Papiloma Manusia biasa terjadi pada perempuan usia reproduksi. Infeksi ini dapat menetap, berkembang menjadi displasi atau sembuh sempurna. Virus ini ditemukan pada 95% kasus Kanker Leher Rahim. Ada dua golongan HPV yaitu HPV risiko tinggi atau disebut HPV onkogenik yaitu utamanya tipe 16, 18, dan 31, 33, 45, 52, 58; sedangkan HPV risiko rendah atau HPV non-onkogenik yaitu tipe 6, 11, 32, dsb.

Proses terjadinya Kanker Leher Rahim sangat erat berhubungan dengan proses metaplasia. Masuknya mutagen atau bahan-bahan yang dapat mengubah perangai sel secara genetik pada saat fase aktif metaplasia dapat berubah menjadi sel yang berpotensi ganas. Perubahan ini biasanya terjadi di daerah transformasi. Sel yang mengalami mutasi disebut sel displastik dan kelainan epitelnya disebut displasia (Neoplasia Intraepitel Leher rahim/ NIS). Dimulai dari displasia ringan, sedang, berat dan karsinoma in-situ dan kemudian berkembang menjadi karsinoma invasif. Lesi displasia dikenal juga sebagai "lesi prakanker". Perbedaan derajat displasia didasarkan atas tebal epitel yang mengalami kelainan dan berat ringannya kelainan pada sel. Sedangkan karsinoma in-situ adalah gangguan maturasi epitel skuamosa yang menyerupai karsinoma invasif tetapi membrana basalisnya masih utuh. Pada lesi prakanker derajat ringan dapat mengalami regresi spontan dan menjadi normal kembali. Tetapi pada lesi derajat sedang dan berat lebih berpotensi berubah menjadi kanker invasif.

C. Faktor Resiko

Faktor yang menyebabkan perempuan terpapar HPV (sebagai etiologi dari Kanker Leher Rahim) adalah :

- 1. Menikah/ memulai aktivitas seksual pada usia muda (kurang dari 20 tahun).
- 2. Berganti-ganti pasangan seksual.
- 3. Berhubungan seks dengan laki-laki yang sering berganti pasangan.
- 4. Riwayat infeksi di daerah kelamin atau radang panggul.

- 5. Perempuan yang melahirkan banyak anak.
- 6. Perempuan perokok mempunyai risiko dua setengah kali lebih besar untuk menderita Kanker Leher Rahim dibanding dengan yang tidak merokok.
- 7. Perempuan yang menjadi perokok pasif (yang tinggal bersama keluarga yang mempunyai kebiasaan merokok) akan meningkat risikonya 1,4 (satu koma empat) kali dibanding perempuan yang hidup dengan udara bebas.
- 8. Perempuan yang pernah melakukan pemeriksaan skrining (Papsmear atau IVA) akan menurunkan risiko terkena Kanker Leher Rahim.

D. Deteksi Dini/Skrining

Ada beberapa metode yang dikenal untuk melakukan skrining Kanker Leher Rahim. Tujuan skrining untuk menemukan lesi prakanker. Beberapa metode itu antara lain:

- Inspeksi Visual dengan Aplikasi Asam Asetat (IVA)
 Pemeriksaan dengan cara mengamati dengan menggunakan spekulum, melihat leher rahim yang telah dipulas dengan asam asetat atau asam cuka (3-5%). Pada lesi prakanker akan menampilkan warna bercak putih yang disebut acetowhite epitelium.
- 2. Pemeriksaan Sitologi (Papanicolaou/Papsmear)
 Merupakan suatu prosedur pemeriksaan sederhana melalui pemeriksaan sitopatologi, yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan perubahan morfologis dari sel-sel epitel leher rahim yang ditemukan pada keadaan prakanker dan kanker.

E. Kelompok Sasaran Skrining

Melihat dari perjalanan penyakit Kanker Leher Rahim, kelompok sasaran skrining Kanker Leher Rahim adalah:

- 1. Perempuan berusia 30 50 tahun
- 2. Perempuan yang menjadi klien pada klinik IMS dengan discharge (keluar cairan) dari vagina yang abnormal atau nyeri pada abdomen bawah (bahkan jika di luar kelompok usia tersebut).
- 3. Perempuan yang tidak hamil (walaupun bukan suatu hal yang rutin, perempuan yang sedang hamil dapat menjalani skrining dengan aman, tetapi tidak boleh menjalani pengobatan dengan krioterapi) oleh karena itu IVA belum dapat dimasukkan pelayanan rutin pada klinik antenatal.
- 4. Perempuan yang mendatangi Puskesmas, klinik IMS, dan klinik KB dianjurkan untuk skrining Kanker Leher Rahim.

F. Frekuensi Skrining

Seorang perempuan yang mendapat hasil tes IVA-negatif, harus menjalani skrining 3 - 5 tahun sekali. Mereka yang mempunyai hasil tes IVA-positif dan mendapatkan pengobatan, harus menjalani tes IVA berikutnya enam bulan kemudian.

G. Pendokumentasian Hasil Pemeriksaan IVA Test

	Ya Tidak		Contoh Peta Serviks
Vulva			
√agina	Sebutkan	********	
Serviks	Sebutkan	5055 1505506755655501 -2	(
Pemeriksaan bimanual			1 2001
Uterus	Sebutkan	********	
Adnexa			
Perneriksaan Rectovaginal (jika diindikasikan)	Sebutkan	<u>E</u>	Sambungan skuamokolumnar (SSE) Lesi epitel putih Ostium Uteri (OUE)
lasil IVA & Penatalaksana	7 4 60	•	Kanker
Hasii IVA & Penacalaksana Hasii IVA	san		
IVA Negatif			/ i '
Anjuran kembali se melakukan tes (bila		Anjuran datang segera bila ada keluhan)	
VA Positif			+
Beri konseling ten	tang risiko kanker 🔲 I	Pengobatan yang diberi	kan
leher rahim dan p	ihan pengobatan	Krioterapi (petunjuk	diberikan)
Menerima pengob	atan yang dianjurkan	Lainnya (petunjuk di	berikan)
Tanggal kunjunga	n ulang	1	
Diduga IMS			
Diobati	Dimin		
Diobati	Diruju	C	***)
<u>Ruj</u> ukan			
		celuas sampai dinding va	
<u>Ruj</u> ukan	nim Lesi m		gina
Rujukan Curiga kanker leher rah	nim Lesi m	eluas sampai dinding va	gina
Rujukan Curiga kanker leher rah Lesi >75%	nim Lesi m	eluas sampai dinding va	gina tan lanjutan
Rujukan Curiga kanker leher rah Lesi >75%	nim Lesi m	eluas sampai dinding vaç cuntuk tes atau pengoba Nama pemeriksa	gina tan lanjutan
Rujukan Curiga kanker leher rah Lesi >75% Lesi >2 mm melebihi uj	im Lesi m Diruju	eluas sampai dinding vaç cuntuk tes atau pengoba	gina tan lanjutan
Rujukan Curiga kanker leher rah Lesi >75% Lesi >2 mm melebihi uj	im Lesi m Diruju	eluas sampai dinding vaç cuntuk tes atau pengoba Nama pemeriksa	gina tan lanjutan
Rujukan Curiga kanker leher rat Lesi >75% Lesi >2 mm melebihi uj Persetujuan Tindakan Me	im Lesi m Diruju	eluas sampai dinding vag cuntuk tes atau pengoba Nama pemeriksa Tanda tangan	gina tan lanjutan tanggal
Rujukan Curiga kanker leher rah Lesi >75% Lesi >2 mm melebihi uj Persetujuan Tindakan Me	im Lesi m Diruju ung prob krio	eluas sampai dinding vag cuntuk tes atau pengoba Nama pemeriksa Tanda tangan	gina tan lanjutan tanggal
Rujukan Curiga kanker leher rah Lesi >75% Lesi >2 mm melebihi uj Persetujuan Tindakan Me Bersama ini saya mengetal dan bersedia mendapatkan	im Lesi m Diruju ung prob krio kdik hui bahwa saya didiagnosa :	eluas sampai dinding vag cuntuk tes atau pengoba Nama pemeriksa Tanda tangan	gina tan lanjutan tanggal
Rujukan Curiga kanker leher rah Lesi >75% Lesi >2 mm melebihi uj Persetujuan Tindakan Me Bersama ini saya mengetal dan bersedia mendapatkan	im Lesi m Diruju ung prob krio sdik hui bahwa saya didiagnosa : n tindakan pengobatan berupa	eluas sampai dinding vag cuntuk tes atau pengoba Nama pemeriksa Tanda tangan	gina tan lanjutan tanggal
Rujukan Curiga kanker leher rah Lesi >75% Lesi >2 mm melebihi uj Persetujuan Tindakan Me Bersama ini saya mengetal dan bersedia mendapatkan setelah saya mendapatkan yang akan saya alami.	im Lesi m Diruju ung prob krio kdiik hui bahwa saya didiagnosa : n tindakan pengobatan berupa penjelasan dan mengerti aka	eluas sampai dinding vag cuntuk tes atau pengoba Nama pemeriksa Tanda tangan	gina tan lanjutan tanggal lakan20


Gambar 6.1 Pendokumentasian Hasil Pemeriksaan IVA (sumber : Kemenkes)

H. Formulir IVA Positif

FORMULIR REGISTER IVA POSITIF DETEKSI DINI KANKER LEHER RAHIM DI PUSKESMAS/RS

Kabupaten :		Bulan Tahun	Fautonianianiani														
				T T			1000000	rkshovan	Kr	ioterapi		Kunjur	ngan Ulla	ng			
No	No. Register	Nama Kilen	Umur	Nama Suami	Alamat	at pertama Hari Hari yg Ada 5 bin krio 1 ti	pertama			Keteranga							
						035-71	Gesmil korosi	Negatif	sama	(tal)	Keluhan	Pos	Neg	Pos	Neg	1	
[1]	[2]	[3]	- 9	[4]	[5]	[6]	171	[8]	[9]	1101	[11]	[12]	[13]	[14]	1151	[16]	
			- 3	0. 1		4			-	_		-		- 8	-8	6	
		-	- 3			4-	-	-	-			-		-	-	e.	
			-			+-	-	Н	-					- 1	-	<u>e.</u>	
																-	
													2 9		T.	Ø.	
				20. 20.		1 1									0	90	
			- 0										0		- 0	90 90	
															- 0	<u> </u>	
	Vancous I		- 8	× 1		+	13 ÷	-		<u> </u>			× 1	-	- 22	×	
_	TOTAL		-			٠,	-	_		٠.		<u> </u>	-	_	<u> </u>	- 17	
										Kepala Pu	skesmas .			,1			

Gambar 6.2 Formulir IVA Positif



- * lesi > 75% meluas ke dinding vagina atau lebih dari 2 mm dari diameter krioprob atau ke dalam saluran diluar jangkauan krioprobe.
- **6 bulan I: 6 bulan pasca krio pertama

Gambar 6.3 Diagram Alur untuk Pelayanan Kanker Serviks

^{***6} bulan II: 6 bulan pasca krio kedua

PRODI	PEMERIKSAAN IVA								
KEBIDANAN	NO DOKUMEN	NO REVISI	HALAMAN						
PROGRAM									
PROFESI PROSEDUR	TANGGAL	DITETA	DK VN OI EN						
TETAP	DITETAPKAN								
ILIAI	DITETALINAN	()						
Pengertian	Pemeriksaan leher rahim	n secara visual me	nggunakan asam cuka						
	(IVA) berarti melihat leh								
	mendeteksi abnormalita	s setelah pengole	san asam asetat atau						
	cuka (3-5%). Daerah y	ang tidak normal	akan berubah warna						
	dengan batas yang tegas menjadi putih (acetowhite), yang								
	mengindikasikan bahwa	a leher rahim n	nungkin memiliki lesi						
Indikasi	prakanker. Untuk semua perempu	ian yang tolah	aktif socara soksual						
IIIulkasi	PUS,menopause dan lar	, ,	antii secala sensual,						
Tujuan	Untuk mengetahui ca		dini kanker serviks						
'	menggunakan metode I\								
Petugas	Mahasiswa Kebidanan								
Skenario	Seorang perempuan da	atang ke Puskesr	mas untuk melakukan						
	pemeriksaan IVA								
Pengkajian	Mengkaji keadaan umun	•							
Persiapan pasien	Menjelaskan tujuan dilak								
Persiapan ruang	Persiapan ruang dan ala								
dan alat	 Ruangan yang nyan Ventilasi cukup 	nan dan tertutup							
	3. Spekulum								
	4. Swab lidi								
	5. Asam asetat 5%								
	6. Lampu sorot								
	7. Air DTT 8. Kapas DTT								
	Tempat cuci tangan								
	10. Handuk/lap bersih								
	11. Sabun cuci tangan								
Langkah-langkah	Penilaian klien dar	n persiapan							
	2. Test IVA	11							
	3. Tindakan pasca te	st IVA							
	4. Konseling pasca ti								
Referensi	Peraturan Menteri Kes		•						
	Penanggulangan Kanker	Payudara dan Ka	nker Leher Rahim						

CEKLIST PEMERIKSAAN IVA TEST

Nilai 1 = Dilakukan Kurang Sempurna Nilai 2 = Dilakukan Dengan Sempurna

NO	BUTIR YANG DINILAI	0	1	2
Α	SIKAP DAN PERILAKU			
1	Menjelaskan tujuan dan prosedur yang akan dilaksanakan			
2	Melakukan komunikasi selama tindakan			
3	Melakukan cuci tangan dan keringkan dengan handuk pribadi (pra dan paska tindakan)			
4	Memakai dan melepas sarung tangan steril atau DTT			
5	Melakukan dekontaminasi alat paska tindakan			
	Score: 10			
В	PENILAIAN CONTENT/ISI			
	Penilaian klien dan persiapan			
1	Sebelum melakukan tes IVA, diskusikan tindakan dengan ibu/klien. Jelaskan mengapa tes tersebut dianjurkan dan apa yang akan terjadi pada saat pemeriksaan. Diskusikan juga mengenai sifat temuan yang paling mungkin dan tindak lanjut atau pengobatan yang mungkin diperlukan.			
2	Pastikan semua peralatan dan bahan yang diperlukan tersedia, termasuk spekulum steril atau yang telah di DTT, kapas lidi dalam wadah bersih, botol berisi larutan asam asetat dan sumber cahaya yang memadai. Tes sumber cahaya untuk memastikan apakah masih berfungsi.			
3	Bawa ibu ke ruang pemeriksaan. Minta dia untuk Buang Air Kecil (BAK) jika belum dilakukan. Jika tangannya kurang bersih, minta ibu membersihkan dan membilas daerah kemaluan sampai bersih. Minta ibu untuk melepas pakaian (termasuk pakaian dalam) sehingga dapat dilakukan pemeriksaan panggul dan tes IVA.			
4	Bantu ibu untuk memposisikan dirinya di meja ginekologi dan tutup badan ibu dengan kain, nyalakan lampu/senter dan arahkan ke vagina ibu.			
5	Memakai APD (celemek, topi, kacamata, dan masker)			
6	Cuci tangan secara merata dengan sabun dan air sampai benar-benar bersih, kemudian keringkan dengan kain bersih atau diangin-anginkan. Lakukan palpasi abdomen, dan perhatikan apabila ada kelainan. Periksa juga bagian lipat paha, apakah ada benjolan atau ulkus (apabila terdapat ulkus terbuka, pemeriksaan dilakukan dengan memakai sarung tangan). Cuci tangan kembali.			
7	Pakai sepasang sarung tangan periksa yang baru pada kedua tangan atau sarung tangan bedah yang telah di- DTT1.			
	Domonikasan IVA			
8	Pemeriksaan IVA Posisi pemeriksa duduk menghadap ke arah vulva dan melakukan inspeksi di daerah vulva dan perineum. Inspeksi/periksa genitalia eksternal dan lihat apakah terjadi			



discharge pada mulut uretra. Palpasi kelenjar Skene's and Bartholin's. Jangan menyentuh kiltoris, karena akan menimbulkan rasa tidak nyaman pada ibu. Katakan pada ibu/kilen bahwa spekulum akan dimasukkan dan mungkin ibu akan merasakan beberapa tekanan. 9 Melakukan vulva hygiene dengan kapas DTT (kapas satu persatu) Dengan hati-hati masukkan spekulum sepenuhnya atau sampai terasa ada tahanan lalu secara perlahan buka bilah/daun spekulum untuk melihat leher rahim. Atur spekulum sehingga seluruh leher rahim dapat terlihat. Hal tersebut mungkin sulit pada kasus dengan leher Rahim yang berukuran besar atau sangat anterior atau posterior. Mungkin perlu menggunakan spatula atau alat lain untuk mendorong leher rahim dengan hati-hati ke atas atau ke bawah agar dapat terlihat. Amati leher rahim apakah ada infeksi (cervicitis) seperti discharge/cairan keputihan mucous ectopi (ectropion); kista Nabothy atau kista Nabothian, nanah, atau lesi "strawberry"(infeksi Trichomonas). Gunakan kapas lidi bersih untuk membersihkan cairan yang keluar, darah atau mukosa dari leher rahim. Buang kapas lidi ke dalam wadah anti bocor atau kantung plastik. Basahi kapas lidi dengan larutan asam asetat 3-5% dan oleskan pada leher rahim. Bila perlu, gunakan kapas lidi bersih untuk mengulang pengolesan asam asetat sampai seluruh permukaan leher rahim benar-benar telah dioleskan asam asetat secara merata. Buang kapas lidi yang telah dipakai. Menungggu 1 menit dan melakukan interpretasi hasil : a. Positif apabila tidak terjadi perubahan warna pada porsio Bila pemeriksaan visual pada leher rahim telah selesai, gunakan kapasa lidi yang baru untuk menghilangkan sisa asam asetat dari leher rahim dan vagina. Buang kapas sehabis dipakai pada tempatnya. Lepaskan spekulum secara halus. Jika hasil tes IVA negatif, letakkan spekulum secara halus. Jika hasil tes IVA negatif, letakkan spekulum ke dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit untuk didesinfeksi. Lakukan pemeriksaan bimanual dan rectovagina (bila diindikasikan). Periksa kelembutan gerakan				
Dengan hati-hati masukkan spekulum sepenuhnya atau sampai terasa ada tahanan lalu secara perlahan buka bilah/daun spekulum untuk melihat leher rahim. Atur spekulum sehingga seluruh leher rahim dapat terlihat. Hal tersebut mungkin sulit pada kasus dengan leher Rahim yang berukuran besar atau sangat anterior atau posterior. Mungkin perlu menggunakan spatula atau alat lain untuk mendorong leher rahim dengan hati-hati ke atas atau ke bawah agar dapat terlihat. Amati leher rahim apakah ada infeksi (cervicitis) seperti discharge/cairan keputihan mucous ectopi (ectropion); kista Nabothy atau kista Nabothian, nanah, atau lesi "strawberry"(infeksi Trichomonas). Gunakan kapas lidi bersih untuk membersihkan cairan yang keluar, darah atau mukosa dari leher rahim. Buang kapas lidi ke dalam wadah anti bocor atau kantung plastik. Basahi kapas lidi dengan larutan asam asetat 3-5% dan oleskan pada leher rahim. Bila perlu, gunakan kapas lidi bersih untuk mengulang pengolesan asam asetat sampai seluruh permukaan leher rahim benar-benar telah dioleskan asam asetat secara merata. Buang kapas lidi yang telah dipakai. Menungggu 1 menit dan melakukan interpretasi hasil: a. Positif apabila porsio berubah warna dari asli merah menjadi putih pucat/aceto white ephitelium b. Negatif apabila porsio berubah warna dari asli merah menjadi putih pucat/aceto white ephitelium b. Negatif apabila porsio berubah warna bada porsio Bila pemeriksaan visual pada leher rahim telah selesai, gunakan kapas lidi yang baru untuk menghilangkan sisa asam asetat dari leher rahim dan vagina. Buang kapas sehabis dipakai pada tempatnya. Lepaskan spekulum secara halus. Jika hasil tes IVA negatif, letakkan spekulum ke dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit untuk didesinfeksi. Lakukan pemeriksaan bimanual dan rectovagina (bila diindikasikan). Periksa kelembutan gerakan leher rahim; ukuran, bentuk, dan posisi rahim; apakah ada kehamillan atau abnormalitas dan pembesaran uterus atau kepekaan (tenderness) pada adnexa. Memberitahukan kepada pasien bahwa peme		Bartholin's. Jangan menyentuh klitoris, karena akan menimbulkan rasa tidak nyaman pada ibu. Katakan pada ibu/klien bahwa spekulum akan dimasukkan dan mungkin		
sampai terasa ada tahanan lalu secara perlahan buka bilah/daun spekulum untuk melihat leher rahim. Atur spekulum sehingga seluruh leher rahim dapat terlihat. Hal tersebut mungkin sulit pada kasus dengan leher Rahim yang berukuran besar atau sangat anterior atau posterior. Mungkin perlu menggunakan spatula atau alat lain untuk mendorong leher rahim dengan hati-hati ke atas atau ke bawah agar dapat terlihat. Amati leher rahim apakah ada infeksi (cervicitis) seperti discharge/cairan keputihan mucous ectopi (ectropion); kista Nabothy atau kista Nabothian, nanah, atau lesi "strawberry" (infeksi Trichomonas). Gunakan kapas lidi bersih untuk membersihkan cairan yang keluar, darah atau mukosa dari leher rahim. Buang kapas lidi ke dalam wadah anti bocor atau kantung plastik. Basahi kapas lidi dengan larutan asam asetat 3-5% dan oleskan pada leher rahim. Bila perlu, gunakan kapas lidi bersih untuk mengulang pengolesan asam asetat sampai seluruh permukaan leher rahim benar-benar telah dioleskan asam asetat secara merata. Buang kapas lidi yang telah dipakai. Menungggu 1 menit dan melakukan interpretasi hasil: a. Positif apabila poriso berubah warna dari asli merah mejadi putih pucat/aceto white ephitelium b. Negatif apabila tidak terjadi perubahan warna pada porsio Bila pemeriksaan visual pada leher rahim telah selesai, gunakan kapas lidi yang baru untuk menghilangkan sisa asam asetat dari leher rahim dan vagina. Buang kapas sehabis dipakai pada tempatnya. Lepaskan spekulum secara halus. Jika hasil tes IVA negatif, letakkan spekulum ke dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit untuk didesinfeksi. Lakukan pemeriksaan bimanual dan rectovagina (bila diindikasikan). Periksa kelembutan gerakan leher rahim; ukuran, bentuk, dan posisi rahim; apakah ada kehamilan atau abnormalitas dan pembesaran uterus atau kepekaan (tenderness) pada adnexa. Memberitahukan kepada pasien bahwa pemeriksaan sudah selesai, merapikan pasien dan menyampaikan hasil pemeriksaan	9	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
discharge/cairan keputihan mucous ectopi (ectropion); kista Nabothy atau kista Nabothian, nanah, atau lesi "strawberry" (infeksi Trichomonas). Gunakan kapas lidi bersih untuk membersihkan cairan yang keluar, darah atau mukosa dari leher rahim. Buang kapas lidi ke dalam wadah anti bocor atau kantung plastik. Basahi kapas lidi dengan larutan asam asetat 3-5% dan oleskan pada leher rahim. Bila perlu, gunakan kapas lidi bersih untuk mengulang pengolesan asam asetat sampai seluruh permukaan leher rahim benar-benar telah dioleskan asam asetat secara merata. Buang kapas lidi yang telah dipakai. Menungggu 1 menit dan melakukan interpretasi hasil: a. Positif apabila porsio berubah warna dari asli merah menjadi putih pucat/aceto white ephitelium b. Negatif apabila tidak terjadi perubahan warna pada porsio Bila pemeriksaan visual pada leher rahim telah selesai, gunakan kapas lidi yang baru untuk menghilangkan sisa asam asetat dari leher rahim dan vagina. Buang kapas sehabis dipakai pada tempatnya. Lepaskan spekulum secara halus. Jika hasil tes IVA negatif, letakkan spekulum secara halus. Jika hasil tes IVA negatif, letakkan spekulum ke dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit untuk didesinfeksi. Lakukan pemeriksaan bimanual dan rectovagina (bila diindikasikan). Periksa kelembutan gerakan leher rahim; ukuran, bentuk, dan posisi rahim; apakah ada kehamilan atau abnormalitas dan pembesaran uterus atau kepekaan (tenderness) pada adnexa. Memberitahukan kepada pasien bahwa pemeriksaan sudah selesai, merapikan pasien dan menyampaikan hasil pemeriksaan	10	sampai terasa ada tahanan lalu secara perlahan buka bilah/daun spekulum untuk melihat leher rahim. Atur spekulum sehingga seluruh leher rahim dapat terlihat. Hal tersebut mungkin sulit pada kasus dengan leher Rahim yang berukuran besar atau sangat anterior atau posterior. Mungkin perlu menggunakan spatula atau alat lain untuk mendorong leher rahim dengan hati-hati ke atas atau ke bawah agar dapat terlihat.		
keluar, darah atau mukosa dari leher rahim. Buang kapas lidi ke dalam wadah anti bocor atau kantung plastik. Basahi kapas lidi dengan larutan asam asetat 3-5% dan oleskan pada leher rahim. Bila perlu, gunakan kapas lidi bersih untuk mengulang pengolesan asam asetat sampai seluruh permukaan leher rahim benar-benar telah dioleskan asam asetat secara merata. Buang kapas lidi yang telah dipakai. Menungggu 1 menit dan melakukan interpretasi hasil: a. Positif apabila porsio berubah warna dari asli merah menjadi putih pucat/aceto white ephitelium b. Negatif apabila tidak terjadi perubahan warna pada porsio Bila pemeriksaan visual pada leher rahim telah selesai, gunakan kapas lidi yang baru untuk menghilangkan sisa asam asetat dari leher rahim dan vagina. Buang kapas sehabis dipakai pada tempatnya. Lepaskan spekulum secara halus. Jika hasil tes IVA negatif, letakkan spekulum secara halus. Jika hasil tes IVA negatif, letakkan spekulum ke dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit untuk didesinfeksi. Lakukan pemeriksaan bimanual dan rectovagina (bila diindikasikan). Periksa kelembutan gerakan leher rahim; ukuran, bentuk, dan posisi rahim; apakah ada kehamilan atau abnormalitas dan pembesaran uterus atau kepekaan (tenderness) pada adnexa. Memberitahukan kepada pasien bahwa pemeriksaan sudah selesai, merapikan pasien dan menyampaikan hasil pemeriksaan	11	discharge/cairan keputihan mucous ectopi (ectropion); kista Nabothy atau kista Nabothian, nanah, atau lesi		
oleskan pada leher rahim. Bila perlu, gunakan kapas lidi bersih untuk mengulang pengolesan asam asetat sampai seluruh permukaan leher rahim benar-benar telah dioleskan asam asetat secara merata. Buang kapas lidi yang telah dipakai. Menungggu 1 menit dan melakukan interpretasi hasil: a. Positif apabila porsio berubah warna dari asli merah menjadi putih pucat/aceto white ephitelium b. Negatif apabila tidak terjadi perubahan warna pada porsio Bila pemeriksaan visual pada leher rahim telah selesai, gunakan kapas lidi yang baru untuk menghilangkan sisa asam asetat dari leher rahim dan vagina. Buang kapas sehabis dipakai pada tempatnya. Lepaskan spekulum secara halus. Jika hasil tes IVA negatif, letakkan spekulum ke dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit untuk didesinfeksi. Lakukan pemeriksaan bimanual dan rectovagina (bila diindikasikan). Periksa kelembutan gerakan leher rahim; ukuran, bentuk, dan posisi rahim; apakah ada kehamilan atau abnormalitas dan pembesaran uterus atau kepekaan (tenderness) pada adnexa. Memberitahukan kepada pasien bahwa pemeriksaan sudah selesai, merapikan pasien dan menyampaikan hasil pemeriksaan Membereskan alat dan membuang sampah pada	12	keluar, darah atau mukosa dari leher rahim. Buang kapas lidi ke dalam wadah anti bocor atau kantung plastik.		
a. Positif apabila porsio berubah warna dari asli merah menjadi putih pucat/aceto white ephitelium b. Negatif apabila tidak terjadi perubahan warna pada porsio Bila pemeriksaan visual pada leher rahim telah selesai, gunakan kapas lidi yang baru untuk menghilangkan sisa asam asetat dari leher rahim dan vagina. Buang kapas sehabis dipakai pada tempatnya. Lepaskan spekulum secara halus. Jika hasil tes IVA negatif, letakkan spekulum ke dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit untuk didesinfeksi. Lakukan pemeriksaan bimanual dan rectovagina (bila diindikasikan). Periksa kelembutan gerakan leher rahim; ukuran, bentuk, dan posisi rahim; apakah ada kehamilan atau abnormalitas dan pembesaran uterus atau kepekaan (tenderness) pada adnexa. Memberitahukan kepada pasien bahwa pemeriksaan sudah selesai, merapikan pasien dan menyampaikan hasil pemeriksaan Membereskan alat dan membuang sampah pada	13	oleskan pada leher rahim. Bila perlu, gunakan kapas lidi bersih untuk mengulang pengolesan asam asetat sampai seluruh permukaan leher rahim benar-benar telah dioleskan asam asetat secara merata. Buang kapas lidi yang telah		
gunakan kapas lidi yang baru untuk menghilangkan sisa asam asetat dari leher rahim dan vagina. Buang kapas sehabis dipakai pada tempatnya. Lepaskan spekulum secara halus. Jika hasil tes IVA negatif, letakkan spekulum ke dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit untuk didesinfeksi. Lakukan pemeriksaan bimanual dan rectovagina (bila diindikasikan). Periksa kelembutan gerakan leher rahim; ukuran, bentuk, dan posisi rahim; apakah ada kehamilan atau abnormalitas dan pembesaran uterus atau kepekaan (tenderness) pada adnexa. Memberitahukan kepada pasien bahwa pemeriksaan sudah selesai, merapikan pasien dan menyampaikan hasil pemeriksaan Membereskan alat dan membuang sampah pada	14	a. Positif apabila porsio berubah warna dari asli merah menjadi putih pucat/aceto white ephitelium b. Negatif apabila tidak terjadi perubahan warna pada porsio		
letakkan spekulum ke dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit untuk didesinfeksi. Lakukan pemeriksaan bimanual dan rectovagina (bila diindikasikan). Periksa kelembutan gerakan leher rahim; ukuran, bentuk, dan posisi rahim; apakah ada kehamilan atau abnormalitas dan pembesaran uterus atau kepekaan (tenderness) pada adnexa. Memberitahukan kepada pasien bahwa pemeriksaan sudah selesai, merapikan pasien dan menyampaikan hasil pemeriksaan Membereskan alat dan membuang sampah pada	15	gunakan kapas lidi yang baru untuk menghilangkan sisa asam asetat dari leher rahim dan vagina. Buang kapas		
diindikasikan). Periksa kelembutan gerakan leher rahim; ukuran, bentuk, dan posisi rahim; apakah ada kehamilan atau abnormalitas dan pembesaran uterus atau kepekaan (tenderness) pada adnexa. Memberitahukan kepada pasien bahwa pemeriksaan sudah selesai, merapikan pasien dan menyampaikan hasil pemeriksaan Membereskan alat dan membuang sampah pada	16	letakkan spekulum ke dalam larutan klorin 0,5% selama 10		
selesai, merapikan pasien dan menyampaikan hasil pemeriksaan Membereskan alat dan membuang sampah pada	17	diindikasikan). Periksa kelembutan gerakan leher rahim; ukuran, bentuk, dan posisi rahim; apakah ada kehamilan atau abnormalitas dan pembesaran uterus atau kepekaan		
	18	selesai, merapikan pasien dan menyampaikan hasil		
	19			

	Tindakan Pasca Test IVA		
20	Bersihkan lampu dengan lap yang dibasahi larutan klorin 0.5% atau alkohol untuk menghindari kontaminasi silang antar pasien.		
21	Diskusikan dengan klien hasil tes IVA dan pemeriksaan panggul bersama Ibu/klien. Jika hasil tes IVA negatif, beritahu kapan klien harus kembali untuk tes IVA		
22	Jika hasil tes IVA positif atau diduga ada kanker, katakan pada ibu/klien langkah selanjutnya yang dianjurkan. Jika pengobatan dapat segera diberikan, diskusikan kemungkinan tersebut bersamanya. Jika perlu rujukan untuk tes atau pengobatan lebih lanjut, aturlah waktu untuk rujukan dan berikan formulir yang diperlukan sebelum ibu/klien tersebut meninggalkan Puskesmas/klinik. Akan lebih baik jika kepastian waktu rujukan dapat disampaikan pada waktu itu juga.		
	Score : 44		
С	TEKNIK		
1	Melaksanakan tindakan secara sistematis/berurutan		
2	Menjaga privasi pasien		
	Score: 4		
	Total Score : 58		
	NILAI AKHIR = (Total Score/) x 100		

MATERI 7 MENYIAPKAN SEDIAAN PEMERIKSAAN PAPSMEAR

CEKLIST SEDIAAN PEMERIKSAAN PAP-SMEAR

Nilai 0 = Jika Tidak Dilakukan

Nilai 1 = Dilakukan Kurang Sempurna

Nilai 2 = Dilakukan Dengan Sempurna

NO	BUTIR YANG DINILAI	0	1	2
Α	SIKAP DAN PERILAKU			
1	Menjelaskan tujuan dan prosedur yang akan dilaksanakan			
2	Melakukan komunikasi selama tindakan			
3	Melakukan cuci tangan dan keringkan dengan handuk pribadi (pra dan paska tindakan)			
4	Memakai dan melepas sarung tangan steril atau DTT			
5	Melakukan dekontaminasi alat paska tindakan			
	Score: 10			
В	PENILAIAN CONTENT/ISI			
6	Mempersilakan pasien untuk melepas pakaian dalam, meminta pasien untuk mengosongkan kandung kemih			
7	Memposisikan pasien di meja Gynekologi dengan posisi litotomi			
8	Memakai APD (celemek, topi, kacamata, dan masker)			
9	Menghidupkan lampu sorot, diarahkan dengan benar pada bagian yang akan diperiksa			
10	Posisi pemeriksa duduk menghadap ke arah vulva dan melakukan inspeksi di daerah vulva dan perineum			
11	Melakukan vulva hygiene dengan kapas DTT (kapas satu persatu)			
12	Memasang spekulum, menguncinya dengan benar dan hati - hati			
13	Melakukan inspeksi porsio			
14	Mengambil sekret dengan spatula Ayre dengan ujung pendek mengusap 360 derajat sesuai arah jarum jam pada ektoserviks			
15	Mengoleskan sekret dari spatula Ayre pada permukaan obyek glass sekali usap, tipis dan merata berlawanan arah jarum jam			
16	Obyek glass dimasukkan pada larutan fiksasi alkohol 95% selama 30 menit			
17	Melepas spekulum dengan hati – hati			
18	Memberitahukan kepada pasien bahwa pemeriksaan sudah selesai, merapikan pasien dan menyampaikan hasil pemeriksaan			
19	Membereskan alat dan membuang sampah pada tempatnya			

	Score : 28		
С	TEKNIK		
20	Melaksanakan tindakan secara sistematis/berurutan		
21	Menjaga privasi pasien		
	Score: 4		
	Total Score : 42		
	NILAI AKHIR = (Total Score/42) x 100		